




### Exercice 3 ( 7 points )

Soit  $ABC$  un triangle rectangle et isocèle en  $A$  et  $I$  le milieu de  $[BC]$ .  $E$  est le symétrique de  $I$  par rapport à  $A$  et  $F$  le symétrique de  $A$  par rapport à  $C$ . (voir figure)

On pose  $AB = a$ ,  $a > 0$ .

- 1
  - a Calculer  $AI$  en fonction de  $a$ .
  - b Calculer, en fonction de  $a$ , les produits scalaires suivants :  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AI}$  et  $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{AE}$ .
  - c Montrer que les droites  $(FI)$  et  $(BE)$  sont perpendiculaires.
- 2 Soit l'ensemble  $\Delta = \{M \in P \text{ tel que } \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BE} = -a^2\}$ .
  - a Montrer que  $I \in \Delta$ .
  - b Déterminer l'ensemble  $\Delta$ .
- 3 Soit l'ensemble  $\mathcal{C} = \{M \in P \text{ tel que } \overrightarrow{AM}^2 - 2\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AI} = 0\}$ .
  - a Soit  $D$  le point tel que  $ABDC$  est un carré, écrire  $D$  comme barycentre des points  $A$  et  $I$ .
  - b Montrer que  $M \in \mathcal{C}$  si, et seulement si,  $\overrightarrow{AM} \cdot (\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MI}) = 0$ .
  - c Montrer alors que  $\mathcal{C}$  est un cercle qu'on précisera.




### Exercice 4 ( 5 points )

(A) Soit  $f$  la fonction définie par  $f(x) = \sqrt{3x^2 - x^3}$

- 1 Déterminer l'ensemble de définition de  $f$ .
- 2
  - a Justifier que pour tout réel  $x$  on a :  $3x^2 - x^3 = 4 - (x-2)^2(x+1)$ .
  - b En déduire que  $f$  admet un maximum sur  $[0; 3]$  que l'on précisera.

(B) Dans la figure ci- contre :

- $[AB]$  est un segment de longueur 4.
- $H$  est un point de  $[AB]$  tel que  $AH = 1$ .
- $M$  est un point de  $[HB]$  tel que  $BM = x$ .
- $\Gamma$  est le demi-cercle de diamètre  $[AM]$ .
- La perpendiculaire à  $(AB)$  en  $H$  coupe  $\Gamma$  en  $D$



- 1
  - a Justifier que  $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AM} = AD^2$
  - b En déduire que  $AD = \sqrt{4-x}$
  - c Calculer alors  $DH$
- 2 Déterminer alors la position du point  $M$  pour que l'aire du triangle  $BMD$  est maximale.

# ∞ Devoir de Contrôle n°1 ∞



## Exercice 1 (3 points)

Pour chacune des questions suivantes une seule de trois réponses proposées est exacte.

Indiquer sur votre copie le numéro de la question et la lettre qui correspond

- 1 Soit  $f$  la fonction définie par :  $f(x) = \frac{x^2 + 1}{|x + 2| - |x - 2|}$  Le domaine de définition de  $f$  est :

a ] $-\infty; -2$ [  b ] $-2; 2$ [  c  $\mathbb{R}^*$

- 2 La fonction  $f$  est :

a Paire  b Impaire  c Ni paire ni impaire

- 3 A et B deux points du plan et I le milieu de  $[AB]$ .

a  $\vec{IA} \cdot \vec{IB} = 0$   b  $\vec{IA} \cdot \vec{IB} = AI^2$   c  $\vec{IA} \cdot \vec{IB} = -\frac{AB^2}{4}$

- 4 L'ensemble des points M du plan tels que  $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$

a La droite (AB)  b La médiatrice de [AB]  c le Cercle de diamètre [AB]



## Exercice 2 (5 points)

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + 1}$ .

- 1  a Vérifier que la fonction  $f$  est paire puis interpréter graphiquement.

b Montrer que pour tout réel  $x$  de  $[0, +\infty[$  on a  $f(x) \leq \frac{1}{2}$ .

c En déduire que  $f$  admet un maximum sur  $\mathbb{R}$

- 2 Montrer que  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .

- 3 Étudier le sens de variation de  $f$  sur  $[0, +\infty[$ .

- 4 Pour tout réel  $x$ , on pose :  $g(x) = f(x) - x^2$ .

a Prouver que  $g$  est strictement décroissante sur  $[0, +\infty[$ .

b Montrer que l'équation  $g(x) = 0$  admet dans  $[0, 1]$  une solution  $\alpha$ .

g)  $\mathbb{E}_{n \in \mathbb{N}}$

$D_f \subset \mathbb{R}$  ①

•  $\forall n \in \mathbb{R}, (-n) \in \mathbb{R} \Rightarrow (-n) \in D_f$

$f(-n) = f(n) \rightarrow f$  est paire

graphiquement l'axe des ordonnées est un axe de symétrie pour le centre de  $f$  dans un repère orthogonal

b)  $\forall n \in [0; +\infty[$

$$n^2 \geq 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{n^2 + 1} \geq 1$$

$$\Rightarrow \sqrt{n^2 + 1} + 1 \geq 2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1} + 1} \geq \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow f(n) \geq \frac{1}{2}$$

c) •  $\forall n \in [0; +\infty[ ; f(n) \leq \frac{1}{2}$  ①

•  $\forall n \in ]-\infty; 0]$  on a  $(-n) \in [0; +\infty[$

D'après ① on a  $f(-n) \leq \frac{1}{2}$

donc  $\forall n \in ]-\infty; 0]$  on a  $f(n) \leq \frac{1}{2}$  ②  
(car  $f$  est paire donc  $\forall n \in \mathbb{R}, f(n) = f(-n)$ )

① + ②  $\Rightarrow \forall n \in \mathbb{R}, \text{ on a } f(n) \leq \frac{1}{2}$

$$\text{or } f(0) = \frac{1}{2}$$

donc  $\left\{ \begin{array}{l} \forall n \in \mathbb{R}, f(n) \leq \frac{1}{2} = f(0) \\ f \text{ admet un maximum } \frac{1}{2} \end{array} \right.$

$\Rightarrow f$  admet un maximum  $\frac{1}{2}$   
sur  $\mathbb{R}$  en 0

2) La fonction  $n \mapsto n^2 + 1$  polynôme

continu sur  $\mathbb{R}$  et  $\forall n \in \mathbb{R}; n^2 + 1 > 0$

donc la fonction  $n \mapsto \sqrt{n^2 + 1}$  est continue sur  $\mathbb{R}$

donc la fonction  $n \mapsto \sqrt{n^2 + 1} + 1$  est

continue et s'annule pas sur  $\mathbb{R}$

donc la fonction  $n \mapsto \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1} + 1}$   
est continue sur  $\mathbb{R}$  donc  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$

### Pr de Contrôle N°3

3) Soit  $a$  et  $b$  2 réels de  $[0; +\infty[$   
tq  $a < b$

on a  $0 \leq a < b$

$$\Rightarrow a^2 < b^2$$

$$\Rightarrow a^2 + 1 < b^2 + 1$$

$$\Rightarrow \sqrt{a^2 + 1} < \sqrt{b^2 + 1}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{a^2 + 1} + 1} > \frac{1}{\sqrt{b^2 + 1} + 1}$$

$$\rightarrow f(a) > f(b)$$

donc  $f$  est décroissante sur  $[0; +\infty[$   
strictement

4) a) Soit  $a$  et  $b$  2 réels de  $[0; +\infty[$

tq  $a < b$

$$\Rightarrow 0 \leq a < b$$

$$\Rightarrow a^2 < b^2$$

$$\Rightarrow -a^2 > -b^2$$

donc la fonction  $n \mapsto -n^2$  est strictement  
croissante sur  $[0; +\infty[$

on a  $\left\{ \begin{array}{l} f \text{ est strictement décroissante sur } [0; +\infty[ \\ \text{la fonction } n \mapsto -n^2 \text{ est} \\ \text{strictement décroissante sur } [0; +\infty[ \end{array} \right.$

donc la fonction  $n \mapsto f(n) + (-n^2)$

est strictement croissante sur  $[0; +\infty[$

donc la fonction  $g: n \mapsto f(n) - n^2$   
est strictement croissante sur  $[0; +\infty[$

b)  $\left\{ \begin{array}{l} f \text{ est continue sur } [0; 1] \text{ (car elle est } \mathbb{C} \text{ sur } \mathbb{R}) \\ \text{et} \\ n \mapsto -n^2 \text{ polynôme continu sur } [0; 1] \end{array} \right.$

donc la fonction  $n \mapsto f(n) - n^2$   
(car elle est aussi)

est continue sur  $[0; 1]$

comme somme de 2 fonctions continues  
sur  $[0; 1]$  donc  $g$  est continue sur  $[0; 1]$  ①

$$\begin{cases} g(0) = f(0) - 0^2 = \frac{1}{2} \\ g(1) = f(1) - 1^2 = \frac{1}{\sqrt{2}+1} - 1 = \frac{\sqrt{2}-1}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Donc  $f(0)$  est compris entre  $g(1)$  et  $g(0)$

$$\textcircled{1} \text{ et } \textcircled{2} \Rightarrow \text{L'équation } g(n) = 0$$

admet dans  $[0;1]$  au moins une solution


or  $g$  est strictement décroissante sur  $[0;1]$

Donc l'équation  $g(n) = 0$  admet dans  $[0;1]$  une seule solution  $\alpha$

Ensuite

$$\text{Df} = \{n \in \mathbb{R} / 3n^2 - n^3 \geq 0\}$$

$$3n^2 - n^3 = n^2(3 - n)$$



2) a)  $\forall n \in \mathbb{R}$ , on a :

$$\begin{aligned} 4 - (n-2)^2(n+1) &= 4 - (n+1)(n^2 - 4n + 4) \\ &= 4 - n^3 + 4n^2 - 4n - n^2 + 4n - 4 \\ &= 3n^2 - n^3 \end{aligned}$$

b)  $\forall n \in [0;3]$  on a :

$$(n-2)^2(n+1) \geq 0$$

$$-(n-2)^2(n+1) \leq 0$$

$$4 - (n-2)^2(n+1) \leq 4$$

$$0 \leq 3n^2 - n^3 \leq 4$$

$$\sqrt{3n^2 - n^3} \leq 2$$

$$\Rightarrow f(n) \leq 2$$

$$\text{or } f(2) = 2$$

$f(n)$  est maximum

$\Rightarrow f(n)$  est maximal

donc  $n = 2$  (car  $f$  admet

un max sur  $[0;3]$  en  $x_0 = 2$ )

donc  $\forall n \in [0;3]$  :

$f(n) \leq f(2)$  et  $f(2) = 2$

donc  $f$  admet un maximum sur  $[0;3]$  égal à 2 en  $x_0 = 2$

(B)

$$\textcircled{1} \text{ a) } \vec{AD} \cdot \vec{AM} = \vec{AD} \cdot \vec{AD}$$

(car  $D \in (r)$  le demi cercle de droite  $[AM]$  donc le triangle  $(ADM)$  est rectangle en  $D$ )  
donc  $D$  est le projet ortho de  $M$  sur  $(AD)$

$$= AD^2$$

$$\textcircled{1} \text{ b) } \vec{AD} \cdot \vec{AM} = \vec{AH} \cdot \vec{AM} \quad \begin{matrix} (\text{car } H \text{ est le project}^2 \\ \text{ortho de } D \text{ sur } [AM]) \end{matrix}$$

$$= AH \times AM$$

$$= 1 \times (4 - n)$$

$$= 4 - n$$

$$\text{or } \vec{AD} \cdot \vec{AM} = AD^2$$

$$\text{donc } AD^2 = 4 - n$$

$$\Rightarrow AD = \sqrt{4 - n}$$

c)  $AMD$  est un triangle rectangle en  $D$

et  $H$  est le proj ortho de  $D$  sur  $[AM]$

donc

$$DH^2 = HA \times HM$$

$$= 1 \times (3 - n)$$

$$= 3 - n$$

$$\Rightarrow DH = \sqrt{3 - n}$$

2) Soit  $A(n)$  l'aire du triangle  $MBD$

on a  $H$  le proj ortho de  $D$  sur  $[MB]$

$$\text{donc } A(n) = \frac{BM \times DH}{2} \text{ et } n \in [0;3]$$

$$= \frac{n \times \sqrt{3-n}}{2} \text{ et } n \in [0;3]$$

$$= \frac{\sqrt{n^2 \times \sqrt{3-n}}}{2} \text{ et } n \in [0;3]$$

$$= \frac{\sqrt{n^2(3-n)}}{2} = \frac{\sqrt{3n^2 - n^3}}{2} = \frac{1}{2} f(n)$$

$$= A + B$$