

Correction Pré - Bac

Bac MATH 2021

Série établie et Corrigée par :

Mr M. MAAOUIA



98 600 618 - 20 810 290


SOMMAIRE



Exercice N° 01 :	03
Exercice N° 02 :	03
Exercice N° 03 :	05
Exercice N° 04 :	06
Exercice N° 05 :	07
Exercice N° 06 :	08
Exercice N° 07 :	10
Exercice N° 08 :	11
Exercice N° 09 :	13
Exercice N° 10 :	14
Exercice N° 11 :	15
Exercice N° 12 :	16
Exercice N° 13 :	17
Exercice N° 14 :	19
Exercice N° 15 :	19
Exercice N° 16 :	20
Exercice N° 17 :	20
Exercice N° 18 :	22

Exercice N° 19 :	23
Exercice N° 20 :	23
Exercice N° 21 :	24
Exercice N° 22 :	25
Exercice N° 23 :	26
Exercice N° 24 :	27
Exercice N° 25 :	28
Exercice N° 26 :	29
Exercice N° 27 :	30
Exercice N° 28 :	31
Exercice N° 29 :	32
Exercice N° 30 :	34
Exercice N° 31 :	35
Problème N° 01 :	36
Problème N° 01 :	37
Problème N° 01 :	39
Problème N° 01 :	41
Conseils Pratiques :	44

COMPLEXE



Exercice N° 01:

$$\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$$

$$(E): z^2 - 2e^{i\theta}z + e^{i2\theta} - i = 0$$

$$1) a) z = 0 \text{ Sol de } (E) \Leftrightarrow e^{i2\theta} - i = 0$$

$$\Leftrightarrow e^{i2\theta} = i = e^{i\frac{\pi}{2}} \Leftrightarrow 2\theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

$$\Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{4} + k\pi \text{ or } \theta \in]0, \frac{\pi}{2}[\Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

$$b) \Delta' = (e^{i\theta})^2 - (e^{i\theta} - i) = i = (e^{i\frac{\pi}{4}})^2$$

$$\Rightarrow z' = e^{i\theta} - e^{i\frac{\pi}{4}}$$

$$z'' = e^{i\theta} + e^{i\frac{\pi}{4}} \quad S_F = \{z', z''\}$$

$$2) A(e^{i\theta} - e^{i\frac{\pi}{4}}) = B(e^{i\theta} + e^{i\frac{\pi}{4}})$$

$$a) z_B = e^{i\theta} + e^{i\frac{\pi}{4}} = e^{i(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{8})} \left[e^{i(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{8})} + e^{i(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{8})} \right]$$

$$= 2 \cos\left(\frac{\theta - \pi}{8}\right) e^{i\left(\frac{\theta + \pi}{8}\right)}$$

$$\text{or } 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \Rightarrow -\frac{\pi}{8} < \frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{8} < \frac{\pi}{8}$$

$$\Rightarrow \cos\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{8}\right) > 0$$

$$\text{d'où } z_B = 2 \cos\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{8}\right) e^{i\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{8}\right)}$$

$$b) OABC \# \Leftrightarrow \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{CB}$$

$$\Leftrightarrow z_A - z_O = z_B - z_C \Rightarrow z_C = z_B - z_A$$

$$\Leftrightarrow z_C = e^{i\theta} + e^{i\frac{\pi}{4}} - e^{i\theta} - e^{i\frac{\pi}{4}} = 2e^{i\frac{\pi}{4}}$$

$$\Rightarrow z_C = 2e^{i\frac{\pi}{4}}$$

$$c) OABC \text{ losange} \Rightarrow OA = OC$$

$$\text{or } OC = |z_C| = 2 \Rightarrow \text{il faut que } OA = 2$$

$$\text{or } OA = |z_A| = |e^{i\theta} - e^{i\frac{\pi}{4}}|$$

$$\Leftrightarrow OA = \left| \cos\theta + i\sin\theta - \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \right|$$

$$\Leftrightarrow OA = \left| \left(\cos\theta - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) + i \left(\sin\theta - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right|$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{\left(\cos\theta - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 + \left(\sin\theta - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2} = 2$$

$$\Leftrightarrow \left(\cos\theta - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 + \left(\sin\theta - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 = 4$$

$$\Leftrightarrow \cos^2\theta - \sqrt{2}\cos\theta + \frac{1}{2} + \sin^2\theta - \sqrt{2}\sin\theta + \frac{1}{2} = 4$$

$$\Leftrightarrow 2 - \sqrt{2}(\cos\theta + \sin\theta) = 4 \Leftrightarrow$$

$$\cos\theta + \sin\theta = -\sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{2} \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = -1 \Rightarrow \theta - \frac{\pi}{4} = \pi + 2k\pi$$

$$\Leftrightarrow \theta = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi \notin]0, \frac{\pi}{2}[$$

$$3) \text{ Ensemble des } z \in B:$$

$$\text{or } z_B = e^{i\theta} + e^{i\frac{\pi}{4}} \Leftrightarrow$$


$$z_B - e^{i\frac{\pi}{4}} = e^{i\theta} \text{ or } I(e^{i\frac{\pi}{4}})$$

$$\Leftrightarrow z_B - z_C = e^{i\theta} \Leftrightarrow \begin{cases} IB = 1 \\ (z, \overline{z}) = \theta \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} B \in \mathcal{C}(I, 1) \\ 0 < \angle(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{IB}) < \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\text{Cml: } B \text{ décrit l'arc } (B_1, B_2) \setminus \{B_1, B_2\}$$

$$\text{avec } B_1(1 + e^{i\frac{\pi}{4}}) \text{ et } B_2(i + e^{i\frac{\pi}{4}})$$



Exercice N° 02:

$$A(i) \quad B(-i) \quad E = \mathcal{C}(0, 1)$$

$$F: M(z) \mapsto M'(z') / z' = \frac{z^2 + 1}{z}$$

$$M'' = S(\omega)(M) \Rightarrow z'' = \overline{z}$$

$$1) a) f(A) = A' / z_A = \frac{(i)^2 + 1}{i} = 0$$

$$\Rightarrow f(A) = 0$$

$$f(B) = B' \Leftrightarrow z_B' = \frac{(-i)^2 + 1}{-i} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{f(B) = 0}$$

b) on pose I : invariant par F
 $\Leftrightarrow F(I) = I \Leftrightarrow z' = z$
 $\Leftrightarrow \frac{z^2 + 1}{z} = z \Leftrightarrow z^2 + 1 = z^2$
 $\Leftrightarrow 1 = 0$: Absurde
 $\Rightarrow F$ n'admet pas de points invariants

c) $\eta (AB)$ globalement inv par F
 $\Leftrightarrow \forall M(z) \in (AB) \Rightarrow F(M) = M' \in (AB)$

or $M(z) \in (AB) \Leftrightarrow z = i\alpha$
 car $(AB) = (O\vec{v})$: axe des imaginaires

$$\Rightarrow z' = \frac{(i\alpha)^2 + 1}{i\alpha} = \frac{1 - \alpha^2}{i\alpha}$$

$$\Rightarrow z' = \frac{1}{i} \left(\frac{1 - \alpha^2}{\alpha} \right) = i \left(\frac{\alpha^2 - 1}{\alpha} \right)$$

$$\Leftrightarrow z' = i\alpha' \in i\mathbb{R} \Rightarrow M' \in (AB)$$

Conf: $(AB) \setminus \{O\}$ est globalement invariant par F .

$$2) a) z = e^{i\theta} \Rightarrow z' = \frac{(e^{i\theta})^2 + 1}{e^{i\theta}}$$

$$\Rightarrow z' = e^{i\theta} + e^{-i\theta} \Rightarrow \boxed{z' = 2 \cos(\theta)}$$

$$b) F(z) = 2 \cos(\theta) \Rightarrow \frac{z^2 + 1}{z} = 2 \cos \theta$$

$$\Leftrightarrow z^2 + 1 = 2z \cos \theta \Leftrightarrow$$

$$z^2 - 2z \cos \theta + 1 = 0$$

$$\Delta' = \cos^2 \theta - 1 = -\sin^2 \theta = (i \sin \theta)^2$$

$$\Rightarrow z' = \cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$$

$$z' = \cos \theta - i \sin \theta = e^{-i\theta}$$

$$S\mathcal{C} = \{e^{i\theta}, e^{-i\theta}\}$$

d) si M décrit $\mathcal{C}_{(0,1)}$ $\Leftrightarrow OM = 1$

$$\Rightarrow z_M = e^{i\theta} \text{ avec } \theta \in \mathbb{R}$$

$$\text{d'où } F(z) = 2 \cos \theta \Leftrightarrow z_M' = 2 \cos \theta$$

$$\text{or } \forall \theta \in \mathbb{R}, -1 \leq \cos \theta \leq 1$$

$$\Rightarrow -2 \leq z_M' \leq 2$$

alors M' décrit le segment $[I, J]$

tel que $I(2)$ et $J(-2)$.

$$3) a) z' - z = \frac{z^2 + 1}{z} - z = \frac{z^2 + 1 - z^2}{z}$$

$$\Rightarrow \boxed{z' - z = \frac{1}{z}}$$

$$b) \text{ d'où } \begin{cases} |z' - z| = \left| \frac{1}{z} \right| \\ \arg(z' - z) = \arg\left(\frac{1}{z}\right) (2\pi) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} MM' = \frac{1}{OM} \\ (\vec{u}, \vec{MM'}) = (\vec{OM}, \vec{u}) (2\pi) \end{cases}$$

$$\text{or } M'' = S_{(O,1/2)}(M) \Rightarrow (\vec{OM}, \vec{u}) = (\vec{u}, \vec{OM'})$$

$$\text{d'où } \begin{cases} MM' = \frac{1}{OM} \\ (\vec{u}, \vec{MM'}) = (\vec{u}, \vec{OM'}) (2\pi) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} MM' = \frac{1}{OM} \\ \vec{MM'} \text{ col à } \vec{OM'} \end{cases} \text{ et de même sens}$$

c) si $M \in \mathcal{C} \Rightarrow OM = 1$

$$\text{d'où } MM' = 1 \Rightarrow MM' = MO$$

d'autre part: $\vec{MM'} \text{ col à } \vec{OM'}$

et de même sens

$$\text{et } MM' = 1 \begin{cases} \Rightarrow \vec{MM'} = \vec{OM'} \\ OM' = OM = 1 \end{cases} \text{ d'où } OM'' = OM' \neq$$

$$\text{on a alors: } \begin{cases} OM'' = OM' \neq OM \\ OM = OM' \end{cases} \Rightarrow \text{losange}$$

$$4) a) \frac{z_M' - z_B}{z_M - z_B} = \frac{z' - z}{z + i} = \frac{z^2 + 1}{z(z + i)}$$

$$= \frac{z^2 + 1}{z(z + i)} = \frac{(z + i)(z - i)}{z(z + i)}$$

$$= \frac{z - i}{z} = \frac{z_M - z_B}{z_M - z_B}$$

$$\text{d'où } \frac{z_M' - z_B}{z_M - z_B} = \frac{z_M - z_B}{z_M - z_B} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} \frac{OM'}{OM} = \frac{AM}{OM} \\ \text{et} \\ (\vec{OM}, \vec{OM'}) = (\vec{OM}, \vec{AM}) (2\pi) \end{cases}$$

$$b) M \in \Delta = \text{med}[OA] \Rightarrow AM = OM$$

$$\Rightarrow \frac{AM}{OM} = 1 \text{ alors } \frac{OM'}{BM} = 1$$

$$\Leftrightarrow OM' = BM$$


$$\text{alors } M' \in \mathcal{C}_{(O, BM)} \quad (1)$$

d'autre part : MM' est à $\vec{OM}$ et de même sens (2)

$$\Rightarrow \text{soit } M'' = S_{(O, \vec{u})}(M)$$

la // à (OM'') passant par M

coupe $\mathcal{C}_{(O, BM)}$ en M' / $\vec{OM}$ de même sens que $\vec{OM}$



Exercice N° 03

$$(A) A(-1) B(i) \text{ et } \operatorname{Re}(z_D) \neq 0$$

$$f: P \setminus \{B\} \rightarrow P$$

$$M(z) \mapsto M'(z') / z' = \frac{z-i}{z+i}$$

$$1) a) \Gamma: z' = -1 \Leftrightarrow \frac{z-i}{z+i} = -1$$

$$\Leftrightarrow z - i = -z - i \Leftrightarrow z = -z$$

$$\Leftrightarrow z \text{ imag pur } \Leftrightarrow M(z) \in (O\vec{y})$$

$$\text{or } M \neq B \Rightarrow \Gamma = (O\vec{y}) \setminus \{B\}$$

$$b) |z'| = \left| \frac{z-i}{z+i} \right| = \frac{|z-i|}{|z+i|} = \frac{|z-i|}{|z-i|} = 1$$


$$\Rightarrow |z'| = 1 \quad \forall M \in P \setminus \{B\}$$

c) Ma $\vec{AM'}$ et $\vec{BM}$ colinéaires

$$\frac{\operatorname{aff}(\vec{AM'})}{\operatorname{aff}(\vec{BM})} = \frac{z'+1}{z-i} = \frac{\frac{z-i}{z+i}+1}{z-i}$$

$$= \frac{z-i + z+i}{(z-i)(z+i)} = \frac{2z}{|z-i|^2} = \frac{2\operatorname{Re}(z)}{|z-i|^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\operatorname{aff}(\vec{AM'})}{\operatorname{aff}(\vec{BM})} \in \mathbb{R} \Rightarrow \vec{AM'} \text{ et } \vec{BM} \text{ colinéaires}$$



$$D \xrightarrow{f} D' \Rightarrow |z_D'| = 1$$

$$\text{d'où } OD' = 1 \Rightarrow D' \in \mathcal{C}_{(O,1)} \quad (1)$$

$$\text{et } \vec{AD'} \text{ et } \vec{BD} \Rightarrow D' \in D: \text{ la //}$$

$$\text{à } (BD) \text{ passant par A} \quad (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow D' \in D \cap \mathcal{C}_{(O,1)}$$

$$\text{or } D' \neq A \text{ car } z' \neq -1 \text{ car } \operatorname{Re}(z_D) \neq 0$$

$$\text{donc } D' = D \cap \mathcal{C}_{(O,1)} \setminus \{A\}$$

$$2) z = e^{i\theta} / \theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$$

$$a) e^{-i} - i = e^{i\theta} + e^{i\frac{\pi}{2}} = e^{i\theta} + e^{i\frac{\pi}{2}}$$

$$= e^{i(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4})} \left(e^{i(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{4})} + e^{i(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4})} \right)$$

$$\Rightarrow e^{-i} - i = 2 \cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) e^{i(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4})}$$

$$\Rightarrow e^{-i} - i = 2 \cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) e^{i(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4})}$$

$$\text{or } -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \Rightarrow 0 < \frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) > 0$$

$$\text{donc } e^{-i} - i = 2 \cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) e^{i(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4})}$$

$$\bullet e^{-i} + i = \overline{e^{-i} - i} = 2 \cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) e^{i(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2})}$$

$$\Rightarrow e^{-i} + i = 2 \cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) e^{i(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2})}$$

$$b) z' = \frac{z-i}{z+i} = \frac{e^{i\theta} - i}{e^{i\theta} + i}$$

$$\Rightarrow z' = \frac{2\cos(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}) e^{i(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{4})}}{2\cos(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}) e^{i(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2})}}$$

$$\Rightarrow z' = e^{i(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2})} = e^{i(\theta - \frac{\pi}{2})}$$

$$c) (e^{i\theta} - i)^3 = (e^{-i\theta} + i)^3 \Rightarrow \left(\frac{e^{i\theta} - i}{e^{-i\theta} + i}\right)^3 = 1$$

$$\Rightarrow (z')^3 = 1 \Rightarrow (e^{i(\theta - \frac{\pi}{2})})^3 = 1$$

$$\Rightarrow e^{i(3\theta - \frac{3\pi}{2})} = e^{i0} \Rightarrow 3\theta - \frac{3\pi}{2} = 2k\pi$$

$$\Rightarrow 3\theta = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2} + \frac{2k\pi}{3}$$

$$\text{or } \theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \Rightarrow k = -1 \Rightarrow \boxed{\theta = -\frac{\pi}{6}}$$

② (E0): $z^2 - 2z\cos\theta + 2(1 - \sin\theta) = 0$

$$1) \Delta' = (\cos\theta)^2 - 2(1 - \sin\theta)$$

$$= 1 - \sin^2\theta - 2 + 2\sin\theta$$

$$= -[1 - 2\sin\theta + \sin^2\theta] = -(1 - \sin\theta)^2$$

$$= [i(1 - \sin\theta)]^2$$

$$\Rightarrow z' = \cos\theta - i(1 - \sin\theta)$$

$$= (\cos\theta + i\sin\theta) - i = e^{i\theta} - i$$

$$z'' = \cos\theta + i(1 - \sin\theta)$$

$$= (\cos\theta - i\sin\theta) + i = e^{-i\theta} + i$$

$$S = \{z', z''\}$$

2) $M_1(z_1 = e^{i\theta} - i) \quad M_2(z_2 = e^{-i\theta} + i)$
 $N(z_3 = 2\cos\theta)$

3) $\frac{\text{aff}(\overrightarrow{M_1M_2})}{\text{aff}(\overrightarrow{ON})} = \frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_0}$

$$= \frac{-e^{i\theta} + i - e^{i\theta} + i}{2\cos\theta} = \frac{2i - 2(e^{i\theta} - e^{-i\theta})}{2\cos\theta}$$

$$= \frac{2i - 2i\sin\theta}{2\cos\theta} = i \frac{(1 - \sin\theta)}{\cos\theta}$$

$$\Rightarrow \frac{\text{aff}(\overrightarrow{M_1M_2})}{\text{aff}(\overrightarrow{ON})} \in i\mathbb{R} \text{ d'où}$$

$\overrightarrow{M_1M_2} \perp \overrightarrow{ON}$ alors:

(M_1M_2) et (ON) sont perpendiculaires

$\bullet \text{aff}(\overrightarrow{M_2N}) = z_3 - z_2 = 2\cos\theta - (e^{-i\theta} + i)$

$$= \cos\theta + i\sin\theta - i = e^{i\theta} - i$$

$$= z_{M_1} - z_0 = \text{aff}(\overrightarrow{OM_1})$$

alors $\overrightarrow{M_2N} = \overrightarrow{OM_1} \Rightarrow OM_1NM_2 \neq$

d'autre part: $(M_1M_2) \perp (ON)$

$\Rightarrow$ diagonales perpendiculaires

Concl: OM_1NM_2 est un losange

b) Ensemble des z tels que M_1

car $z_1 = e^{i\theta} - i$ max $\angle(-i)$

$$\Rightarrow z_{M_1} - z_0 = e^{i\theta} \Rightarrow \begin{cases} |z_{M_1}| = 1 \\ \arg(z_{M_1}) = \theta \end{cases}$$

or $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \Rightarrow -\frac{\pi}{2} < \arg(z_{M_1}) < \frac{\pi}{2}$

Concl: M_1 décrit l'arc $(\overrightarrow{FO}) \setminus \{F, O\}$ du cercle $\mathcal{C}(O, 1)$.

avec $z_0 = -i$ et $z_F = -2i$

Exercice N° 04

(E0): $z^2 - 2(e^{i\theta} - i)z + (e^{i\theta} - i)^2 = 0$

1) $\Delta' = (e^{i\theta} - i)^2 - (e^{i\theta} - i)^2 = 0$

$$\Rightarrow \Delta' = -e^{i2\theta} = (ie^{i\theta})^2$$

$$\Rightarrow z' = e^{i\theta} - i - ie^{i\theta} = (1-i)e^{i\theta} - i$$

$$z'' = e^{i\theta} - i + ie^{i\theta} = (1+i)e^{i\theta} - i$$

$S = \{z', z''\}$

2) $A(-i) \quad M(e^{i\theta}) \quad M'((1-i)e^{i\theta} - i)$

et $M''((1+i)e^{i\theta} - i)$

a) Ensemble des points $M(z)$:

$$\text{ma } z_M = e^{i\theta} \Leftrightarrow \begin{cases} OM = 1 \\ (\vec{O}, \vec{OM}) = \theta \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$\Rightarrow M$ décrit le cercle $C(0, 1)$

b) On $z'' = iz' - (1+i)$

$$\begin{aligned} \text{ma } iz' - (1+i) &= i[(1-i)e^{i\theta} - i] - 1 - i \\ &= (1+i)e^{i\theta} + 1 - i - 1 - i = z'' \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{z'' = iz' - (1+i)}$$

c) On $A \in \text{med}[M'M'']$

$$\text{ma } AM' = |z' - z_A| = |(1-i)e^{i\theta} - i| = \sqrt{2}$$

$$\text{et } AM'' = |z'' - z_A| = |(1+i)e^{i\theta} - i| = \sqrt{2}$$

$$\text{alors } AM' = AM'' \Leftrightarrow A \in \text{med}[M'M'']$$

$$\arg(\overrightarrow{AM'}, \overrightarrow{AM''}) = \arg\left(\frac{z' - z_A}{z'' - z_A}\right)$$

$$= \arg\left(\frac{(1+i)e^{i\theta} - i}{(1-i)e^{i\theta} - i}\right) = \arg(i) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$\text{d) ma } \begin{cases} AM' = AM'' \\ \arg(\overrightarrow{AM'}, \overrightarrow{AM''}) = \frac{\pi}{2} [2\pi] \end{cases}$$

$$\text{alors } \boxed{R(A, \frac{\pi}{2})(M') = M''}$$

$$\text{e) } I = M' \times M''$$

$$\Rightarrow z_I = \frac{z' + z''}{2} = e^{i\theta} - i$$

$$\Leftrightarrow z_I = z_M + z_A \Leftrightarrow z_I - z_M = z_A$$

$$\Leftrightarrow \text{aff}(MI) = \text{aff}(OA)$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{MI} = \overrightarrow{OA} \Leftrightarrow \boxed{I = \overrightarrow{OA}(n)}$$

Exercice N° 05:

$$1) z^2 + \bar{z}^2 - 2z(2+i) = 0$$

$$\text{on pose } z = x+iy \Rightarrow \bar{z} = x-iy$$

$$\text{d'où (E): } (x+iy)^2 + (x-iy)^2 - 2(x+iy)(2+i) = 0$$

$$x^2 + 2ixy - y^2 + x^2 - 2ixy - y^2 - 4x - 2ix - 4iy + 2y = 0$$

$$\Leftrightarrow (2x^2 - 2y^2 - 4x + 2y) - 2i(x+2y) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+2y=0 & (1) \\ 2x^2 - 2y^2 - 4x + 2y = 0 & (2) \end{cases}$$

$$(1) \rightarrow x = -2y \Rightarrow (2): 6y^2 + 10y = 0$$

$$\Leftrightarrow 2y(3y+5) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y=0 \Rightarrow x=0 \\ y=-\frac{5}{3} \Rightarrow x=\frac{10}{3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow S_E = \left\{ 0; \left(\frac{10}{3}; -\frac{5}{3}\right) \right\}$$

$$2) \forall M(z) \in \{0\} \rightarrow M'(z') = \frac{z^2 + \bar{z}^2}{2z}$$

$$\text{et } N(\bar{z})$$

a) On $OM'N$ sont alignés

$$\frac{\text{aff}(\overrightarrow{OM'})}{\text{aff}(\overrightarrow{ON})} = \frac{z'}{z_N} = \frac{z' + \bar{z}^2}{2z\bar{z}} = \frac{2x^2 - 2y^2}{2(x^2 + y^2)}$$

$$= \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \in \mathbb{R}^*$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{OM'} \text{ et } \overrightarrow{ON} \text{ sont alignés}$$

d'où O, M', N sont alignés

$$\text{b) } \Delta = \{M \in P / M' = 0\}$$

$$\Leftrightarrow z' = 0 \Leftrightarrow z^2 + \bar{z}^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 - 2y^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 = y^2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=y \\ y=-x \end{cases} \Rightarrow \Delta \text{ est la } \begin{cases} D_1: y=x \\ D_2: y=-x \end{cases}$$

réunion des droites
privée de O

c) On $\overrightarrow{MM'} \perp \overrightarrow{OM'}$

$$\frac{\text{aff}(\overrightarrow{MM'})}{\text{aff}(\overrightarrow{OM'})} = \frac{z' - z}{z' - 0} = \frac{\frac{z^2 + \bar{z}^2}{2z} - z}{\frac{z^2 + \bar{z}^2}{2z}}$$

$$= \frac{\frac{z^2 - \bar{z}^2}{2z}}{\frac{z^2 + \bar{z}^2}{2z}} = \frac{-4ixy}{2(x^2 - y^2)}$$

$$= \frac{(2xy)}{(y^2 - x^2)}i \in i\mathbb{R}$$


$$\Rightarrow \boxed{\overrightarrow{MM'} \perp \overrightarrow{OM'}}$$

4) soit $M \in P \setminus \{O\}$ et $N = S_{OT}(M)$

$\Rightarrow M' \in (ON)$ ①

et $\overline{MM'} \perp \overline{OM}$ $\Rightarrow M' \in E_{OM}$ ②

① et ② $\Rightarrow M' \in E_{OM} \cap (ON) \setminus \{O\}$



$$e) A'(2+i) \Rightarrow \frac{z_A^2 + \bar{z}_A^2}{2z_A} = 2+i \Leftrightarrow$$

$$\frac{z_A^2 + \bar{z}_A^2}{2z_A} = 2+i \Leftrightarrow$$

$$z_A^2 + \bar{z}_A^2 = 2(2+i)z_A \Leftrightarrow$$

$$z_A^2 + \bar{z}_A^2 - 2(2+i)z_A = 0$$

$\Rightarrow z_A$: solution non nulle de (*)

$$\Rightarrow z_A = \frac{10}{3} - \frac{5}{3}i$$

• Construction du point A :

ona $\overline{OA'} \perp \overline{AA'}$, car $\overline{OM'} \perp \overline{MM'}$


$\Rightarrow A \in \Delta$: la $\perp$ à (OA') passant par A'

ou O, A', N alignés et $N(\frac{5}{3})$

$$\Rightarrow (\vec{u}, \vec{ON}) = -(\vec{u}, \vec{OA'}) [2\pi]$$

$$\Rightarrow A \in [O, T] / (\vec{u}, \vec{OT}) = -(\vec{u}, \vec{OA'}) [2\pi]$$

$$\text{Cml: } A = [OT] \cap \Delta \setminus \{O\}$$



3) $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ et $z = e^{i\theta} \Rightarrow \bar{z} = e^{-i\theta}$
 $\Gamma = \{M(x, y) \in P / 2(y^2 - x^2) = 1 - \sqrt{1 + 8x^2}\}$

$$a) z' = \frac{e^{i2\theta} + e^{-i2\theta}}{2e^{i\theta}} = \frac{2\cos(2\theta)}{2e^{i\theta}} = \cos(2\theta)e^{-i\theta}$$

$$\bullet \text{ Si } \theta \in [0, \frac{\pi}{4}] \Rightarrow z' = \cos(2\theta)e^{-i\theta}$$

$$\bullet \text{ Si } \theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}] \Rightarrow z' = -\cos(2\theta)e^{-i(\pi-\theta)}$$

$$\bullet \text{ Si } \theta = \frac{\pi}{4} \Rightarrow z' = 0 : \text{ pas de valeur exp}$$

$$b) \theta \in [0, \frac{\pi}{4}] \Rightarrow z' = \cos(2\theta)e^{-i\theta}$$

$$\text{alors } z_k = \frac{1}{z'} = \frac{1}{\cos(2\theta)} e^{i\theta} = \frac{\cos\theta + i\sin\theta}{\cos(2\theta)\cos(\theta)}$$

$$\text{d'où } 2[y_k^2 - x_k^2] = 2 \left[\frac{\sin^2\theta}{\cos^2(2\theta)} - \frac{\cos^2\theta}{\cos^2(2\theta)} \right]$$

$$= \frac{-2\cos(2\theta)}{\cos^2(2\theta)} = \frac{-2}{\cos(2\theta)} \quad (1)$$

$$\text{d'autre part:}$$

$$1 - \sqrt{1 + 8x_k^2} = 1 - \sqrt{1 + \frac{8\cos^2\theta}{\cos^2(2\theta)}}$$

$$= 1 - \sqrt{\frac{\cos^2(2\theta) + 8\cos^2\theta}{\cos^2(2\theta)}}$$

$$= 1 - \frac{\sqrt{\cos^2(2\theta) + 8(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2\theta))}}{\cos(2\theta)}$$

$$= 1 - \frac{\sqrt{(\cos(2\theta) + 2)^2}}{\cos(2\theta)} = 1 - \frac{|\cos(2\theta) + 2|}{\cos(2\theta)}$$

$$= 1 - \frac{\cos(2\theta) + 2}{\cos(2\theta)} = \frac{-2}{\cos(2\theta)} \quad (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow 2(y_k^2 - x_k^2) = 1 - \sqrt{1 + 8x_k^2}$$

$$\Leftrightarrow k \in \Gamma$$

Exercice N° 06 :

$$A(1) \quad B(2) \quad \text{et } \theta \in]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[$$

$$(E) \quad iz^2 - 2(i - \cos\theta)z - 2\cos\theta = 0$$

$$1) \Delta' = (i - \cos\theta)^2 + 2i\cos\theta$$

$$= -1 - 2i\cos\theta + \cos^2\theta + 2i\cos\theta$$

$$= -[1 - \cos^2\theta] = -\sin^2\theta = (i\sin\theta)^2$$

$$\bullet z' = \frac{i - \cos\theta - i\sin\theta}{i} = 1 - \sin\theta + i\cos\theta$$

$$\Leftrightarrow z' = 1 + i(\cos\theta + i\sin\theta) = 1 + ie^{i\theta}$$

$$\bullet z'' = \frac{i - \cos\theta + i\sin\theta}{i} = 1 + \sin\theta + i\cos\theta$$

$$\Leftrightarrow z'' = 1 + i(\cos\theta - i\sin\theta)$$

$$\Leftrightarrow z'' = 1 + ie^{-i\theta}$$

$$\text{Soit } S = \{1 + ie^{i\theta}, 1 + ie^{-i\theta}\}$$


$$2) \Gamma = \{M(z) \in \mathbb{C} / \arg\left(\frac{z-2}{z}\right) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]\}$$

$$\arg\left(\frac{z-2}{z}\right) \equiv \arg\left(\frac{z-2}{z}\right) [2\pi]$$

$$= (\vec{OM}, \vec{BM}) [2\pi]$$

$$\text{d'où } \arg\left(\frac{z-2}{z}\right) \equiv (\vec{MO}, \vec{MB}) \equiv -\frac{\pi}{2} [2\pi]$$

alors M décrit l'arc $\widehat{OB}$ du cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $[OB]$



$$3) M_1(1+ie^{i\theta}) \quad M_2(1+ie^{-i\theta})$$

$$a) z_1 = 1+ie^{i\theta} = 1+e^{i(\theta+\frac{\pi}{2})}$$

$$= e^{i(\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{4})} \left[e^{i(\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{4})} + e^{-i(\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{4})} \right]$$

$$= e^{i(\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{4})} \cdot 2\cos\left(\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{4}\right)$$

$$\text{or } \frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \frac{\pi}{4} < \frac{\theta}{2} < \frac{3\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{2} < \frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4} < \pi \Rightarrow \cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) < 0$$

$$\text{alors } z_1 = -2\cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) e^{i(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4})}$$

$$\Rightarrow z_1 = 2\cos\left(\frac{\theta}{2} - \frac{3\pi}{4}\right) e^{i(\frac{\theta}{2} - \frac{3\pi}{4})}$$

$$\begin{aligned} z_2 &= 1+ie^{-i\theta} = 1+e^{i(\frac{\pi}{2}-\theta)} \\ &= e^{i(\frac{\pi}{4}-\frac{\theta}{2})} \left[e^{i(\frac{\theta}{2}-\frac{\pi}{4})} + e^{i(\frac{\pi}{4}-\frac{\theta}{2})} \right] \\ &= 2\cos\left(\frac{\theta}{2}-\frac{\pi}{4}\right) \cdot e^{i(\frac{\pi}{4}-\frac{\theta}{2})} \end{aligned}$$

$$\text{or } \frac{\pi}{4} < \frac{\theta}{2} < \frac{3\pi}{4} \Rightarrow 0 < \frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \cos\left(\frac{\theta}{2}-\frac{\pi}{4}\right) > 0$$

$$\text{d'où } z_2 = 2\cos\left(\frac{\theta}{2}-\frac{\pi}{4}\right) \cdot e^{i(\frac{\pi}{4}-\frac{\theta}{2})}$$

$$\begin{aligned} b) \frac{z_1-2}{z_1} &= \frac{ie^{i\theta}-1}{ie^{i\theta}+1} = \frac{e^{i\theta}+i}{e^{i\theta}-i} = \frac{e^{i\theta}+i}{e^{i\theta}-e^{-i\frac{\pi}{2}}} \\ &= \frac{e^{i(\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{4})} \left[e^{i(\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{4})} + e^{i(\frac{\pi}{4}-\frac{\theta}{2})} \right]}{e^{i(\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{4})} \left[e^{i(\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{4})} - e^{i(\frac{\pi}{4}-\frac{\theta}{2})} \right]} \end{aligned}$$

$$= \frac{2\cos\left(\frac{\theta}{2}-\frac{\pi}{4}\right)}{2i\sin\left(\frac{\theta}{2}-\frac{\pi}{4}\right)} = -i\cotan\left(\frac{\theta}{2}-\frac{\pi}{4}\right)$$

$$\text{or } 0 < \frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \cot\left(\frac{\theta}{2}-\frac{\pi}{4}\right) > 0$$

$$\text{d'où } \frac{z_1-2}{z_1} \in i\mathbb{R}^*$$

$$\begin{aligned} \frac{z_2-2}{z_2} &= \frac{ie^{-i\theta}-1}{ie^{-i\theta}+1} = \frac{e^{-i\theta}+i}{e^{-i\theta}-i} \\ &= \frac{e^{i(\frac{\pi}{2}-\theta)} \left[e^{i(\frac{\pi}{2}-\theta)} + e^{i(\frac{\pi}{4}-\frac{\theta}{2})} \right]}{e^{i(\frac{\pi}{2}-\theta)} \left[e^{i(\frac{\pi}{2}-\theta)} - e^{i(\frac{\pi}{4}-\frac{\theta}{2})} \right]} \end{aligned}$$

$$= \frac{e^{i(\frac{\pi}{2}-\theta)} \left[e^{i(\frac{\pi}{2}-\theta)} - e^{i(\frac{\pi}{4}-\frac{\theta}{2})} \right]}{e^{i(\frac{\pi}{2}-\theta)} \left[e^{i(\frac{\pi}{2}-\theta)} - e^{i(\frac{\pi}{4}-\frac{\theta}{2})} \right]}$$

$$\Rightarrow \frac{z_2-2}{z_2} = \frac{2\cos\left(\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{4}\right)}{-2i\sin\left(\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{4}\right)} = i\cotan\left(\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{4}\right)$$

$$\text{or } \left(\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{4}\right) \in \left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[\Rightarrow \cotan\left(\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{4}\right) < 0$$

$$\text{alors } \frac{z_2-2}{z_2} \in i\mathbb{R}^*$$

$$c) \arg\left(\frac{z_1-2}{z_1}\right) = \arg\left(\frac{z_2-2}{z_2}\right) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$\Rightarrow M_1$ et M_2 décrivent l'arc (Γ)

d) G: centre de gravité de A, M_1, M_2

$$\Rightarrow z_G = \frac{z_A + z_1 + z_2}{3}$$

$$\Rightarrow z_G = \frac{1 + 1 + ie^{i\theta} + 1 + ie^{-i\theta}}{3}$$

$$\Rightarrow z_G = 1 + \frac{i(e^{i\theta} + e^{-i\theta})}{3}$$

$$\Rightarrow z_G = 1 + \left(\frac{2}{3}\cos\theta\right)i$$

$$\text{on pose } G(x, y) \Rightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=\frac{2}{3}\cos\theta \end{cases}$$

$$x_G = 1 \Rightarrow G \in \Delta: x=1$$

$$\theta \in \left]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right[\Rightarrow -1 \leq \cos\theta < 0$$

$$\Rightarrow -\frac{2}{3} \leq \frac{2}{3}\cos\theta < 0$$

$$\text{d'où } y_G \in \left[-\frac{2}{3}, 0\right]$$

Concl: G décrit le segment $[G_A][A]$ avec $G_A(1-\frac{2}{3}i)$ et $A(1,0)$

4) a) $(\vec{AM}_1, \vec{AM}_2) = \arg\left(\frac{z_2 - 1}{z_1 - 1}\right) [2\pi]$
 $= \arg\left[\frac{1 + i e^{-i\theta} - 1}{1 + i e^{i\theta} - 1}\right] [2\pi]$
 $= \arg(e^{-i2\theta}) [2\pi] = -2\theta [2\pi]$

b) $\vec{AM}_1, \vec{AM}_2$ équilateral alors
 $(\vec{AM}_1, \vec{AM}_2) = \pm \frac{\pi}{3} [2\pi]$

$\Leftrightarrow -2\theta = \pm \frac{\pi}{3} [2\pi] \Leftrightarrow$

$\begin{cases} -2\theta = +\frac{\pi}{3} + 2k\pi \\ -2\theta = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \theta = -\frac{\pi}{6} + k\pi \\ \theta = \frac{\pi}{6} + k\pi \end{cases}$

ou $\theta \in]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[\Rightarrow \begin{cases} \theta = \frac{5\pi}{6} \\ \theta = \frac{7\pi}{6} \end{cases}$

Concl: Si $\theta \in \left\{\frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}\right\} \Rightarrow$ le triangle AM_1M_2 est équilateral

Exercice N° 07:

$A(e^{i\theta}) \quad B(e^{-i\theta}) \quad \theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$

$f: M(z) \mapsto M'(z') / z' = \frac{z^2 - 1}{2z - 2\cos\theta}$

1) f existe car $2z \neq 2\cos\theta$

$\Leftrightarrow z \neq \cos\theta$ ou $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$

$\Rightarrow z \notin]0, 1[$

d'où le domaine de f est
 le plan P privé du segment $[0, 1]$
 tel que $I(1)$ y compris 0 et 1
 Concl: $D_f = (P \setminus [0, 1]) \cup \{0, 1\}$

2) a) $\Omega(z)$: invariant par $f \Leftrightarrow$
 $f(z) = \Omega \Leftrightarrow z' = z$
 $\Leftrightarrow \frac{z^2 - 1}{2z - 2\cos\theta} = z \Leftrightarrow z^2 - 1 = 2z^2 - 2z\cos\theta$
 $\Leftrightarrow \boxed{z^2 - 2\cos\theta z + 1 = 0} \quad (E)$

b) $\Delta' = (\cos\theta)^2 - 1 = -\sin^2\theta$
 $\Delta' = (i\sin\theta)^2$

$z_1 = \cos\theta + i\sin\theta = e^{i\theta} = z_A$

$z_2 = \cos\theta - i\sin\theta = e^{-i\theta} = z_B$

3) a) $SC = \left\{ \frac{z^2 - 1}{2z - 2\cos\theta} - e^{i\theta}, \frac{z^2 - 1}{2z - 2\cos\theta} - e^{-i\theta} \right\}$
 $\frac{z' - e^{i\theta}}{z' - e^{-i\theta}} = \frac{\frac{z^2 - 1}{2z - 2\cos\theta} - e^{i\theta}}{\frac{z^2 - 1}{2z - 2\cos\theta} - e^{-i\theta}}$
 $= \frac{z^2 - 1 - 2e^{i\theta}z + 2\cos\theta e^{i\theta}}{z^2 - 1 - 2e^{-i\theta}z + 2\cos\theta e^{-i\theta}}$
 $= \frac{z^2 - 2e^{i\theta}z + (1 + e^{i2\theta}) - 1}{z^2 - 2e^{-i\theta}z + (1 + e^{-i2\theta}) - 1}$

$\Leftrightarrow \frac{z' - e^{i\theta}}{z' - e^{-i\theta}} = \frac{z^2 - 2e^{i\theta}z + e^{i2\theta}}{z^2 - 2e^{-i\theta}z + e^{-i2\theta}}$
 $\Leftrightarrow \frac{z' - e^{i\theta}}{z' - e^{-i\theta}} = \frac{(z - e^{i\theta})^2}{(z - e^{-i\theta})^2} = \left[\frac{z - e^{i\theta}}{z - e^{-i\theta}} \right]^2$

b) d'où $\begin{cases} \left| \frac{z' - e^{i\theta}}{z' - e^{-i\theta}} \right| = \left| \frac{z - e^{i\theta}}{z - e^{-i\theta}} \right|^2 \\ \arg\left(\frac{z' - e^{i\theta}}{z' - e^{-i\theta}}\right) = 2\arg\left(\frac{z - e^{i\theta}}{z - e^{-i\theta}}\right) [2\pi] \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} \left| \frac{z_A' - z_A}{z_A' - z_B} \right| = \left| \frac{z_A - z_A}{z_A - z_B} \right|^2 \\ \arg\left(\frac{z_A' - z_A}{z_A' - z_B}\right) = 2\arg\left(\frac{z_A - z_A}{z_A - z_B}\right) [2\pi] \end{cases}$

4) a) si M décrit $\mathcal{C}_{(AB)} \setminus \{A, B\}$
 $\Rightarrow (\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{2} + k\pi$
 $\Leftrightarrow (\vec{M'A}, \vec{M'B}) = \pi + 2k\pi$
 d'où M' décrit le segment $[AB] \setminus \{A, B\}$

b) $\mathcal{C} \cap (O\vec{u}) = \{E, F\}$
 ou $(O\vec{u}) = \text{med}(AB)$ car $A(e^{i\theta}) \quad B(e^{-i\theta})$
 d'où les triangles EAB et FAB

sont rectangles et isocèles en E et F
 alors $EA = EB$ et $FA = FB$
 si on pose $E' = f(E)$ et $F' = f(F)$
 $\{E, F\} \subset \mathcal{C} \Rightarrow E' \in [AB]$ et $F' \in [AB]$
 et $\frac{E'A}{E'B} = \left(\frac{EA}{EB}\right)^2 = 1 \Rightarrow E' \in \text{méd}(AB)$
 $\Rightarrow E' \in (O\vec{u})$

$$\text{et } \frac{F'A}{F'B} = \left(\frac{FA}{FB}\right)^2 = 1 \Rightarrow F' \in (O\vec{u})$$

$$\text{d'où } \{E', F'\} = [AB] \cap (O\vec{u}) = \{S\}$$

$$\text{avec } S = A * B$$

$$\text{Concl: } f(E) = f(F) = S = A * B$$

$$5) \theta = \frac{\pi}{3}$$


$$\arg\left(\frac{2z-1-i\sqrt{3}}{2z-1+i\sqrt{3}}\right) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$\Rightarrow \arg\left(\frac{z - (\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2})}{z - (\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2})}\right) = \arg\left(\frac{z - e^{i\frac{\pi}{3}}}{z - e^{-i\frac{\pi}{3}}}\right)$$

$$= \arg\left(\frac{z' - e^{i\frac{\pi}{3}}}{z' - e^{-i\frac{\pi}{3}}}\right) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$\Rightarrow \arg\left(\frac{z' - e^{i\frac{\pi}{3}}}{z' - e^{-i\frac{\pi}{3}}}\right) = (\vec{M'B}, \vec{M'A}) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$\Rightarrow M'$ décrit l'arc $(AB) \setminus \{A, B\}$
 du cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $[AB]$



Exercice N° 08 : $\alpha \in [\frac{\pi}{2}, 2\pi]$

$$(E) : z^2 - (e^{i\alpha} - i e^{-i\alpha} + 2)z - i + 2e^{i\alpha} = 0$$

$$1) a) \text{ Soit } z = e^{i\alpha} \Rightarrow e^{i2\alpha} - (e^{i\alpha} - i e^{-i\alpha} + 2)e^{i\alpha} - i + 2e^{i\alpha} = 0$$

$$e^{i2\alpha} - e^{i2\alpha} + i - 2e^{i\alpha} - i + 2e^{i\alpha} = 0 \quad \forall \alpha$$

$$\Rightarrow z_1 = e^{i\alpha} \text{ est une solution de (E)}$$

$$b) S = z_1 + z_2 = \frac{-b}{a} \Leftrightarrow$$

$$e^{i\alpha} + z_2 = e^{i\alpha} - i e^{-i\alpha} + 2$$

$$\Rightarrow \boxed{z_2 = 2 - i e^{-i\alpha}}$$

$$c) -i \bar{z}_1 + 2 = -i e^{-i\alpha} + 2 = z_2$$

$$\text{alors } \boxed{z_2 = -i \bar{z}_1 + 2}$$

$$2) A(1) \quad B(i) \quad M_1(z_1) \text{ et } M_2(z_2)$$

$$\varphi: M(z) \mapsto M'(z') / z' = -i \bar{z} + 2$$

a) Mq φ : Symétrie glissante

$$M(z) \xrightarrow{S(O\vec{u})} M_1(\bar{z}) \xrightarrow{R(0, \frac{\pi}{2})} M_2(-i\bar{z}) \xrightarrow{t_{2\vec{u}}} M'(z')$$

$$\Rightarrow \varphi = t_{2\vec{u}} \circ R(0, \frac{\pi}{2}) \circ S(O\vec{u})$$

alors φ : composée de 2 déplacements
 et d'un anti-déplacement

$\Rightarrow \varphi$: anti-déplacement $\leftarrow$ symétrie glissante

• L'ensemble des pts invariants par φ :

$$\varphi(M) = M \Leftrightarrow z' = z \Leftrightarrow -i \bar{z} + 2 = z$$

$$\Leftrightarrow -i(x-iy) + 2 = x + iy$$

$$\Leftrightarrow (2-y) - ix = x + iy \Leftrightarrow \begin{cases} 2-y=x \\ y=-x \end{cases}$$

$$(1) + (2): 2 = 0 \text{ Absurde } \Rightarrow \varphi \text{ n'admet}$$

pas de points invariants

$\Rightarrow \varphi$: Symétrie glissante dont
 la forme réduite s'écrit

$$\varphi = t_{2\vec{u}} \circ S_D = S_D \circ t_{2\vec{u}}$$

$$\varphi \circ \varphi = t_{2\vec{u}}$$


$$M(z) \xrightarrow{\varphi} M'(z') \xrightarrow{\varphi} M''(z'')$$

$$\text{avec: } \begin{cases} z' = -i \bar{z} + 2 \\ z'' = -i (\bar{z}') + 2 \end{cases}$$





$$\Rightarrow z'' = -i (-i \bar{z} + 2) + 2 = -i(i\bar{z} + 2) + 2$$

$$z'' = z + 2 - 2i$$


Géométrie Plane



Charles Philarète



Exercice N° 09 :



$$R_1 = R(c, \frac{\pi}{3}) \quad \text{et} \quad R_2 = R(o, \frac{2\pi}{3})$$

1) a) $S_{D_1} = R_1 \circ S(o, c)$: antideflect
 $c \xrightarrow{S(o, c)} c \xrightarrow{R_1} c \Rightarrow c \in D_1$
 $B \xrightarrow{S(o, c)} A \xrightarrow{R_1} B \Rightarrow B \in D_1$
 $\Rightarrow D_1 = (CB)$

$S_{D_2} = S(o, c) \circ R_2$: antideflect
 $o \xrightarrow{R_2} o \xrightarrow{S(o, c)} o \Rightarrow o \in D_2$
 $A \xrightarrow{R_2} B \xrightarrow{S(o, c)} A \Rightarrow A \in D_2$
 $\Rightarrow D_2 = (OA)$

b) on a $S_A = R_1 \circ S(o, c) \Rightarrow R_1 = S_A \circ S(o, c)$
 $\vee S_{D_2} = S(o, c) \circ R_2 \Rightarrow R_2 = S(o, c) \circ S_A$
 $\Rightarrow R_1 \circ R_2 = S_A \circ S(o, c) \circ S(o, c) \circ S_A$
 $= S(c, c) \circ S(o, o) = S_I$
 car $(CB) \perp (OA)$ en I
 concl : $R_1 \circ R_2 = S_I$

2) $R_3 = S_D \circ S(BC) = R(o, -\frac{\pi}{3})$

car $D \cap (BC) = \{B\}$

$$2(\widehat{BC}, D) = 2(\widehat{BC}, \widehat{BA}) + (\widehat{BA}, D)$$

$$= 2(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{3} (2\pi)$$

$R_3 \circ R_1 = S_D \circ S(BC) \circ S(BC) \circ S(o, c)$
 $= S_D \circ S(o, c) = t_{2KB}$

car $D // (OC) \perp (AB)$

$\Rightarrow R_3 \circ R_1 = t_{AB}$

3) $f = R_1^{-1} \circ R_3 \circ R_1$

a) f est la composée de 3 rotations de centres différents et dont la somme des angles est $(-\frac{\pi}{3})$
 $\Rightarrow f = R(o, -\frac{\pi}{3})$

or $A \xrightarrow{R_1} B \xrightarrow{R_3} B \xrightarrow{R_1^{-1}} A$
 $\Rightarrow f(A) = A \Rightarrow A$: centre de f
 donc $f = R(A, -\frac{\pi}{3})$

b) $f = R(A, -\frac{\pi}{3}) \Leftrightarrow R_1^{-1} \circ R_3 \circ R_1 = R(A, -\frac{\pi}{3})$

or $R_3 \circ R_1 = t_{AB}$

$\Rightarrow R_1^{-1} \circ t_{AB} = R(A, -\frac{\pi}{3})$

$\Rightarrow t_{AB} = R_1 \circ R(A, -\frac{\pi}{3})$

$$c) R(A, \frac{1}{2}): M \rightarrow M'$$

$$R_1: M \rightarrow M''$$

On a $ABM''M'$ est un #

$$\text{ou } M' \xrightarrow{R(A, \frac{1}{2})} M \xrightarrow{R_1} M''$$

$$\Rightarrow R_1 \circ R(A, \frac{1}{2}) (M') = M''$$

$$\Leftrightarrow t_{\vec{AB}}(M') = M'' \Leftrightarrow \vec{AB} = \vec{M'M''}$$

d'où $ABM''M'$ est un #

Exercice N° 10 :

$$A(2 - \frac{1}{2}i) \quad z_B = \frac{5}{2}$$

$$f: M(z) \mapsto M'(z') / z' = i\bar{z} - 2i + 3$$

1) Mq f: isométrie

$$\text{soit } \left. \begin{array}{l} M_1(z_1) \xrightarrow{f} M'_1(z'_1) \\ M_2(z_2) \xrightarrow{f} M'_2(z'_2) \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\text{Mq } M'_1M'_2 = M_1M_2 \neq 0$$

$$\text{or } \left. \begin{array}{l} z'_1 = i\bar{z}_1 - 2i + 3 \\ z'_2 = i\bar{z}_2 - 2i + 3 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$M'_1M'_2 = |z'_2 - z'_1| = |i\bar{z}_2 - 2i + 3 - i\bar{z}_1 + 2i - 3|$$

$$= |i(\bar{z}_2 - \bar{z}_1)| = |z_2 - z_1| = M_1M_2$$

$\Rightarrow f$ conserve les distances
donc f est une isométrie

• Mq f: n'admet pas de point inv.

on suppose que I: invariant $\Rightarrow z' = z$

$$\Leftrightarrow z = i\bar{z} - 2i + 3$$

$$\Leftrightarrow x + iy = i(x - iy) - 2i + 3$$

$$\Leftrightarrow x + iy = ix + y - 2i + 3$$

$$\Leftrightarrow (x - y - 3) + i(-x + y + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - y - 3 = 0 \\ -x + y + 2 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - y - 3 = 0 \\ -x + y + 2 = 0 \end{cases}$$

$$(1) + (2): -1 = 0 \text{ Absurde}$$

$\Rightarrow f$ n'admet pas de points invariants

$$2) M(z) \xrightarrow{f} M'(z') \xrightarrow{f} M''(z'')$$

$$\text{avec } \begin{cases} z' = i\bar{z} - 2i + 3 \\ z'' = i\bar{z}' - 2i + 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow z'' = i[\overline{i\bar{z} - 2i + 3}] - 2i + 3$$

$$\Leftrightarrow z'' = i[-i\bar{z} + 2i + 3] - 2i + 3$$

$$\Leftrightarrow z'' = z - 2 + 3i - 2i + 3$$

$$\Leftrightarrow z'' - z = 1 + i = z\vec{w}$$

$$\Leftrightarrow \text{aff}(\vec{MM''}) = \text{aff}(\vec{w}) \Leftrightarrow \vec{MM''} = \vec{w}$$

$$\text{alors } M'' = t_{\vec{w}}(M)$$

$$\text{or } f \circ f(M) = M'' \Rightarrow \boxed{f \circ f = t_{\vec{w}}}$$

$$\text{or } f \circ f(M) = M''$$

$$3) T = t_{-\frac{1}{2}\vec{w}} \quad g = T \circ f$$

$$a) A \xrightarrow{f} A' \xrightarrow{T} A''$$

$$\text{telq } z_{A'} = i\bar{z}_A - 2i + 3$$

$$= i(2 + \frac{1}{2}i) - 2i + 3 = \frac{5}{2}$$

$$z_{A''} = z_{A'} - \frac{1}{2}\text{aff}(\vec{w})$$

$$= \frac{5}{2} - \frac{1}{2}(1+i) = 2 - \frac{1}{2}i = z_A$$

$$\Rightarrow T \circ f(A) = A \Leftrightarrow \boxed{g(A) = A}$$

$$B \xrightarrow{f} B' \xrightarrow{T} B''$$

$$z_{B'} = i\bar{z}_B - 2i + 3 = \frac{5}{2}i - 2i + 3$$

$$= 3 + \frac{1}{2}i$$

$$\Rightarrow z_{B''} = z_{B'} - \frac{1}{2}i = \frac{5}{2} = z_B$$

$$\Rightarrow T \circ f(B) = B \Leftrightarrow \boxed{g(B) = B}$$

Nature de g:

g: composée de 2 isométries

$\Rightarrow g$ est une isométrie qui fixe A

et B $\Rightarrow \begin{cases} \vec{g} = \text{Idp} \\ \vec{g} = S(\vec{AB}) \end{cases}$

$$\text{or } O \xrightarrow{f} O' \xrightarrow{T} O''$$

$$\text{avec } z_{O'} = i\bar{z}_O - 2i + 3 = 3 - 2i$$

$$z_{O''} = z_{O'} - \frac{1}{2}i = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}i \neq 0$$

$\Rightarrow g(0) = 0'' \neq 0 \Rightarrow 0$ n'est pas invariant
alors $g \neq \text{Id}$

Concl: $g = S(AB)$

b) $g = T \circ f \Leftrightarrow f = T^{-1} \circ g$

or $T^{-1} = t_{\frac{1}{2}\vec{u}} \Rightarrow f = t_{\frac{1}{2}\vec{u}} \circ g$


$\Rightarrow f = t_{\frac{1}{2}\vec{u}} \circ S(AB)$

car $\text{aff}(\vec{AB}) = \vec{AB} - \vec{BA} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i = \text{aff}(\frac{1}{2}\vec{u})$

$\Rightarrow f = t_{\vec{AB}} \circ S(AB)$

f est donc la symétrie glissante
d'axe (AB) et de vecteur $\vec{AB}$

Exercice N° 11 :



1) a) $Mq \exists !$ antidef. $f: A \rightarrow B$
 $B \rightarrow D$
or $ABCD$ losange $\Rightarrow AB = AD$
or $(\vec{AB}, \vec{AD}) = \frac{\pi}{3} (2\pi) \Rightarrow ABD$ équilatéral

d'où $AB = BD \neq 0$ alors il existe un
unique antihoméomorphisme $f: A \rightarrow B$
 $B \rightarrow D$

b) on suppose que $f = S_D \Rightarrow f \circ f = \text{Id}_D$
or $f \circ f(A) = D \Leftrightarrow \text{Id}_D(A) = D \neq A$ Absurde

$\Rightarrow f$ symétrie glissante dont la forme
réduite s'écrit $f = t_{2\vec{u}} \circ S_D = S_D \circ t_{\vec{u}}$

$\Rightarrow f \circ f = t_{2\vec{u}}: A \rightarrow D \Leftrightarrow 2\vec{u} = \vec{AD}$
 $\Rightarrow \vec{u} = \frac{1}{2}\vec{AD} = \vec{DO}$ car $\begin{cases} I = A+B \\ O = B+D \end{cases}$

d'autre part $f(A) = B \Rightarrow A+B = I \in D$
 $f(B) = D \Rightarrow B+D = O \in D \Rightarrow D = \{O\}$

Concl: $f = t_{\vec{DO}} \circ S(10)$

2) a) $Mq \exists !$ antidef. $g: A \rightarrow D$
 $D \rightarrow K$

or $J = A+D \Rightarrow AJ = \frac{1}{2}AD$

$AD = DC = 2DK \Rightarrow AJ = DK \neq 0$

alors il existe unique antidef. $g: A \rightarrow D$
 $D \rightarrow K$

b) $\text{med}(AD) = (BJ) \setminus \text{ad}(BJ) \neq (BD)$
 $\text{med}(JK) = (BD)$

$\Rightarrow g$ n'est pas symétrie orthogonale

or g : antihoméomorphisme $\Rightarrow g$ symétrie glissante

dont la forme réduite s'écrit :

$g = t_{\vec{u}} \circ S_D = S_D \circ t_{\vec{u}} / \vec{u}$ dir de Δ

or $g(A) = D \Rightarrow A+D = J \in D$

d'où $J \xrightarrow{S_D} J \xrightarrow{t_{\vec{u}}} K$ d'où $\vec{JK} = \vec{u}$

et D : la // à (JK) passant par $J = D = (JK)$

Concl: $g = t_{\vec{JK}} \circ S(JK)$

3) a) $Mq \exists !$ antidef. $h: B \rightarrow D$
 $C \rightarrow B$

or $BC = CA = BD \neq 0$

$\Rightarrow \exists !$ antidef. $h: B \rightarrow D$
 $C \rightarrow B$

b) On suppose que $h = S_D \Rightarrow h \circ h = \text{Id}_D$

or $h \circ h(C) = D \Leftrightarrow \text{Id}_D(C) = D \neq C$ Absurde

$\Rightarrow h \neq S_D \Rightarrow h$ symétrie glissante

or h : antihoméomorphisme

dont la forme réduite s'écrit :

$h = t_{\vec{v}} \circ S_D = S_D \circ t_{\vec{v}}$

$\Rightarrow h \circ h = t_{2\vec{v}}: C \rightarrow D \Leftrightarrow 2\vec{v} = \vec{CD}$

$\Rightarrow \vec{v} = \frac{1}{2}\vec{CD} = \vec{CO}$ car $\begin{cases} L = C+B \\ O = D+B \end{cases}$

et $h(C) = B \Rightarrow C+B = L \in D$
 $h(B) = D \Rightarrow B+D = O \in D \Rightarrow D = \{O\}$

Concl: $h = t_{\vec{CO}} \circ S(LD)$

4) $\varphi = f^{-1} \circ h$

a) $B \xrightarrow{h} D \xrightarrow{f^{-1}} B$
 $L \xrightarrow{h} O \xrightarrow{f^{-1}} I$

car $I \xrightarrow{f(0)} I \xrightarrow{f^{-1}} O$

$\Rightarrow f(I) = O \Rightarrow f^{-1}(O) = I$

Concl: $\varphi(B) = B$ et $\varphi(L) = I$

$$\Rightarrow (\overrightarrow{AI}, \overrightarrow{AD}) \equiv -(\overrightarrow{CI}, \overrightarrow{CF}) \pmod{2\pi}$$

alors ψ isométrie qui envoie les angles orientés en leur opposés

$\Rightarrow \psi$: unique antitélécement

c) On pose $\psi(B) = B'$

$$\text{d'où } \psi: \begin{matrix} A \rightarrow C \\ I \rightarrow J \\ B \rightarrow B' \end{matrix}$$

Comme ψ conserve les milieux } $\Rightarrow$
et que $I = A + B$

$$J = C + B' \Rightarrow B' = S_J(C) = D$$

Conclusion: $\boxed{\psi(B) = D}$

• ψ : antitéléc: $A \rightarrow D$
 $D \rightarrow F$

$$\text{méd}(BD) \neq \text{méd}(DF)$$

$\Rightarrow \psi$ n'est pas symétrie orthogonale

ou ψ : antitélécement

ψ est une symétrie glissante dont la forme réduite s'écrit:

$$\psi = t_{\vec{u}} \circ S_D = S_{D+\vec{u}}$$

$$\text{d'où } \psi \circ \psi = t_{2\vec{u}}: B \rightarrow F$$

$$\Rightarrow 2\vec{u} = \overrightarrow{BF} \text{ alors } \vec{u} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BC}$$

$$\psi(B) = D \Rightarrow B + D = O \in \Delta$$

$$\Rightarrow \Delta: la // a (BC) passant par O$$

$$\Rightarrow \Delta = (13)$$

Conclusion: $\boxed{\psi = S_{(13)} \circ t_{\overrightarrow{BC}}}$

4) $f = \psi \circ S_{(AD)}$

f étant la composée de 2 antitéléc

$\Rightarrow f$ est un déplacement

$$\text{or } A \xrightarrow{S_{(AD)}} A \xrightarrow{\psi} C$$

$$\text{et } D \xrightarrow{S_{(AD)}} D \xrightarrow{\psi} F$$

Donc f déplace qui envoie $A \rightarrow C$
 $D \rightarrow F$

Comme $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB}$

$$\text{alors } (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CF}) \equiv 0 \pmod{2\pi}$$

$$\Rightarrow f = t_{\vec{u}}: A \rightarrow C \Rightarrow \vec{u} = \overrightarrow{AC}$$

Conclusion: $\boxed{f = t_{\overrightarrow{AC}}}$

Exercice N° 13: $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$

$$(E_\theta): z^2 - 2\cos(2\theta)z + 2i\sin(2\theta) = 0$$

$$1) a) (1 - i\sin(2\theta))^2 = 1 - \sin^2(2\theta) - 2i\sin(2\theta) = \cos^2(2\theta) - 2i\sin(2\theta)$$

$$b) D' = \cos(2\theta) - 2i\sin(2\theta)$$

$$\Rightarrow D' = (1 - i\sin(2\theta))^2$$

$$z' = \cos(2\theta) + 1 - i\sin(2\theta) = 1 + (\cos(2\theta) - i\sin(2\theta)) = 1 + e^{-i2\theta}$$

$$z'' = \cos(2\theta) - 1 + i\sin(2\theta) = -1 + (\cos(2\theta) + i\sin(2\theta)) = -1 + e^{i2\theta}$$

$$S_\theta = \{1 + e^{i2\theta}, -1 + e^{i2\theta}\}$$

2) $I(-1) \quad A(-2) \quad M(e^{i2\theta}) \quad M'(1 + e^{-i2\theta})$

$$g: N(z) \mapsto N'(z') / z' = \bar{z} + 2$$

$$N(z) \xrightarrow{S_\theta} N_1(\bar{z}) \xrightarrow{t_{2\vec{u}}} N'(z')$$

$$\text{alors } g = t_{2\vec{u}} \circ S_{(O\bar{u})}$$

Comme $2\vec{u}$: direction de $(O\bar{u})$
 $\Rightarrow g$ est la forme réduite de la symétrie glissante d'axe $(O\bar{u})$ et de vecteur $2\vec{u}$


3) a) Ensemble des points $M(z)$.

$$z_M = -1 + e^{i2\theta} \Rightarrow z_M = z_I + e^{i2\theta}$$

$$\Rightarrow z_M - z_I = e^{i2\theta} \Rightarrow \begin{cases} |z_M - z_I| = 1 \\ \arg(z_M - z_I) = 2\theta \pmod{2\pi} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} IM = 1 \Rightarrow M \in \mathcal{C}(I, 1) \\ (\vec{OI}, \vec{IM}) \equiv 2\theta \pmod{2\pi} \end{cases}$$

$$\text{or } 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \Rightarrow 0 < (\vec{OI}, \vec{IM}) < \pi$$



$\Rightarrow M$ décrit l'arc $(\vec{OA}) \cap \mathcal{C}(I, 1)$

$$b) Z_M = -1 + e^{i2\theta} = -1 + e^{i2\theta} \\ Z_M + 2 = -1 + e^{i2\theta} + 2 = -1 + e^{i2\theta} + 2 = 1 + e^{i2\theta} = Z_{M'}$$

$$\text{alors } M' = g(M)$$


Comme M décrit $\Gamma \Rightarrow M'$ décrit $g(\Gamma) = \Gamma'$

$$\text{or } \Gamma' = (\overrightarrow{OA'}) \setminus \{O, A'\}$$

$$S_{O\Gamma'}(\Gamma') = (\overrightarrow{AO}) \setminus \{O, A\}$$

$$t_{2\theta} (S_{O\Gamma'}(\Gamma')) = (\overrightarrow{OA'}) \setminus \{A', O\}$$

$$\text{cmr: } M' \text{ décrit } (\Gamma') = (\overrightarrow{OA'}) \setminus \{O, A'(2)\}$$



$$4) a) Z_{M'} = 1 + e^{-i2\theta} = e^{-i\theta} (e^{i\theta} + e^{-i\theta})$$

$$\Rightarrow Z_{M'} = 2 \cos \theta \cdot e^{-i\theta}$$

$$\text{comme } \theta \in]0, \frac{\pi}{2}[\Rightarrow \cos \theta > 0$$

$$Z_{M'} = 2 \cos \theta e^{-i\theta}$$

$$b) (\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}) = \arg \left(\frac{Z_M}{Z_{M'}} \right) [2\pi]$$

$$\Rightarrow (\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}) = \arg(Z_M) - \arg(Z_{M'}) [2\pi]$$

$$\text{or } Z_M = -1 + e^{i2\theta} = e^{i\theta} (e^{i\theta} - e^{-i\theta}) \\ = 2i \sin \theta \cdot e^{i\theta} = 2 \sin \theta \cdot e^{i(\theta + \frac{\pi}{2})}$$

$$\text{d'où } (\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}) = \arg(Z_M) - \arg(Z_{M'}) [2\pi] \\ = (\theta + \frac{\pi}{2}) - (\theta) [2\pi]$$

$$\Rightarrow (\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}) = 2\theta + \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$c) O, M, M' \text{ alignés } \Leftrightarrow (\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}) = k\pi$$

$$\Rightarrow 2\theta + \frac{\pi}{2} = k\pi \Rightarrow 2\theta = -\frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{comme } \theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$$

$$5) a) Z_P? / OMPM' \neq \Leftrightarrow$$

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{M'P} \Leftrightarrow Z_M - Z_O = Z_P - Z_{M'}$$

$$\Leftrightarrow Z_P = Z_M + Z_{M'} = -1 + e^{i2\theta} + 1 + e^{-i2\theta}$$

$$\Rightarrow Z_P = e^{i2\theta} + e^{-i2\theta} = 2 \cos(2\theta)$$

$$b) A_{OMPM'} = 2 A_{OPM}$$

$$\text{dans le triangle } OPM, (\overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OM}) = \arg(Z_M)$$

$$\Rightarrow (\overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OM}) = \theta + \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$\Rightarrow A_{OPM} = \frac{1}{2} OP \cdot OM \sin \left(\theta + \frac{\pi}{2} \right) \\ = \frac{1}{2} |Z_M| \cdot |Z_P| \cdot \cos(\theta) \\ = \frac{1}{2} |2 \cos(2\theta)| \cdot |2 \cos \theta| \cdot \cos(\theta)$$

$$\Rightarrow A_{OPM} = |\cos(2\theta) \cdot \cos(\theta)| = \frac{1}{2} |\sin(4\theta)|$$


$$\text{alors } A_{OMPM'} = 2 A_{OPM} = |\sin(4\theta)|$$

$$c) A_{OMPM'} \text{ maximale } \Leftrightarrow |\sin(4\theta)| = 1$$


$$\Rightarrow \begin{cases} \sin(4\theta) = 1 \\ \text{ou} \\ \sin(4\theta) = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4\theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \\ \text{ou} \\ 4\theta = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \theta = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2} \\ \text{ou} \\ \theta = -\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2} \end{cases} \text{ or } \theta \in]0, \frac{\pi}{2}[\Rightarrow \begin{cases} \theta = \frac{\pi}{8} \\ \text{ou} \\ \theta = \frac{3\pi}{8} \end{cases}$$


Concl: Si $\theta \in \left\{ \frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8} \right\} \Rightarrow$ l'aire du parallélogramme $OMPM'$ maximale



Arithmétique



Carl F. GAUSS



Exercice N° 14 : Q. C. M

1) $x \equiv 1 [4] \Leftrightarrow x = 1 + 4k$
 alors $x^2 = (1 + 4k)^2 = 1 + 8k + 16k^2$
 $\Leftrightarrow x^2 = 1 + 8[k + 2k^2] \Leftrightarrow x^2 \equiv 1 [8]$
 d'où Vrai

2) 17: premier et 17 ne divise pas 2012

$\Rightarrow$ d'après Fermat :

$$2012^{16} \equiv 1 [17]$$

alors $2012^{32} \equiv 1 [17] \Rightarrow$ Vrai

3) $7^3 = 343 \equiv 1 [9]$

$$\Rightarrow 7^{3n} \equiv 1 [9] \Rightarrow 7^{3n} - 1 \equiv 0 [9]$$

$$\Rightarrow 9 \text{ divise } (7^{3n} - 1) \Rightarrow$$
 Vrai

4) $35 \equiv 1 [17] \Rightarrow 35^{2006} \equiv 1 [17]$

alors $2 \times 35^{2006} \equiv 2 [17]$ ①

et $84 \equiv -1 [17] \Rightarrow 84^{2007} \equiv -1 [17]$

d'où $-3 \times 84^{2007} \equiv 3 [17]$ ②

① + ② : $2 \times 35^{2006} - 3 \times 84^{2007} \equiv 5 [17]$

$$\Rightarrow$$
 Faux

Le dernier théorème de Fermat

L'histoire de l'énigme qui a défié les plus grands esprits du monde pendant



Exercice N° 15 :

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad U_n = 2^n + 3^n + 6^n - 1$$

1) on a déjà $2^n \equiv 0 [2]$ et $6^n \equiv 0 [2]$

$$3 \equiv 1 [2] \Rightarrow 3^n \equiv 1 [2] \Rightarrow 3^n - 1 \equiv 0 [2]$$

conf : $U_n = 2^n + 3^n + 6^n - 1 \equiv 0 [2]$

2) n : pair $\Rightarrow n = 2p$

$$\Rightarrow U_n = 2^{2p} + 3^{2p} + 6^{2p} - 1$$

$$\Leftrightarrow U_n = (2^2)^p + (3^2)^p + (6^2)^p - 1$$

$$\Leftrightarrow U_n = 4^p + 9^p + 36^p - 1$$

on $4^p \equiv 0 [4]$ et $36^p \equiv 0 [4]$

$$9 \equiv 1 [4] \Rightarrow 9^p \equiv 1 [4] \Rightarrow 9^p - 1 \equiv 0 [4]$$

alors $U_n \equiv 0 [4]$ si n : pair

3) p : premier tel que $p > 3$

a) p : premier ne divise ni 2 ni 3

$$\Rightarrow 2^{p-1} \equiv 1 [p] \text{ et } 3^{p-1} \equiv 1 [p]$$

$$\Leftrightarrow 2(2^{p-2}) \equiv 1 [p] \text{ et } 3(3^{p-2}) \equiv 1 [p]$$

alors $3[2(2^{p-2})] \equiv 3 [p] \text{ et } 2[3(3^{p-2})] \equiv 2 [p]$

$$\Leftrightarrow 6 \times 2^{p-2} \equiv 3 [p] \text{ et } 6 \times 3^{p-2} \equiv 2 [p]$$

b) Dq $6 \times 4_{p-2} \equiv 0 [P]$
 on a p ne divise pas 6 et p premier
 $\Rightarrow 6^{p-1} \equiv 1 [P] \Rightarrow 6(6^{p-2}) \equiv 1 [P]$
 or $6 \times 2^{p-2} \equiv 3 [P]$
 $6 \times 3^{p-2} \equiv 2 [P]$
 $6 \times 6^{p-2} \equiv 1 [P]$

$$\Sigma: 6 [2^{p-2} + 3^{p-2} + 6^{p-2}] \equiv 6 [P]$$

$$\Rightarrow 6 (4_{p-2} + 1) \equiv 6 [P]$$

$$\Rightarrow 6 \cdot 4_{p-2} + 6 \equiv 6 [P]$$

$$\Rightarrow \boxed{6 \cdot 4_{p-2} \equiv 0 [P]}$$

c) $P: \text{divise } 6 \cdot 4_{p-2} \} \Rightarrow \text{d'après}$
 $P \wedge 6 = 1$

Gauss P divise 4_{p-2}

$$\text{alors } \boxed{4_{p-2} \equiv 0 [P]}$$

4) $N = 4 \cdot 99^{69} + 27^{23} + 6^{69} - 4$
 on a $4 \cdot 99 \equiv 2 [7] \Rightarrow 4 \cdot 99^{69} \equiv 2^{69} [7]$

d'où $N \equiv 2^{69} + (3^3)^{23} + 6^{69} - 4 [7]$

$$\Rightarrow N \equiv 2^{69} + 3^{69} + 6^{69} - 1 - 3 [7]$$

$$\Rightarrow N \equiv 4_{69} - 3 [7]$$

on d'après 3) 71: premier > 3

$$\Rightarrow 71 \mid 4_{69} \Rightarrow 4_{69} \equiv 0 [71]$$

d'où $4_{69} - 3 \equiv -3 [71]$

$$\Rightarrow N \equiv 68 [71] \Rightarrow \text{le reste est } 68$$

Exercice N° 16 :

① $\begin{cases} a = 5n + 4 \\ b = 3n + 1 \end{cases} / n \in \mathbb{Z}$

1) $d \mid a \} \Rightarrow d \mid 3a - 5b$
 $d \mid b \}$

on $3a - 5b = 3(5n + 4) - 5(3n + 1)$
 $= 15n + 12 - 15n - 5 = 7$

$$\Rightarrow \boxed{d \text{ divise } 7}$$

2) soit $d = a \wedge b \Rightarrow d \mid 7$

$$\Rightarrow d \in \mathbb{D}_7^+ = \{1, 7\}$$

$$\Rightarrow d = 1 \text{ ou } d = 7$$

• Si $d = 7 \Rightarrow 7 \mid b \Rightarrow$

$$\Rightarrow b \equiv 0 [7] \Rightarrow 3n + 1 \equiv 0 [7]$$

$$\Rightarrow 3n \equiv -1 [7] \Rightarrow 6n \equiv -2 [7]$$

or $6 \equiv -1 [7] \Rightarrow 6n \equiv -n [7]$

d'où $-n \equiv -2 [7] \Rightarrow n \equiv 2 [7]$

ainsi: $\boxed{\begin{matrix} \text{Si } n \equiv 2 [7] \Rightarrow d = 7 \\ \text{Si non } \Rightarrow d = 1 \end{matrix}}$

3) $\begin{cases} a = 5 \times (2019)^{2020} + 4 \\ b = 3 \times (2019)^{2020} + 1 \end{cases}$

$$\Rightarrow n = (2019)^{2020}$$

$$\text{or } 2019 \equiv 3 [7]$$

$$\Rightarrow (2019)^{2020} \equiv 3^{2020} [7]$$

$$\text{or } 3^{2020} = (3^6)^{336} \times 3^4$$

or comme $3^6 \equiv 1 [7] \Rightarrow (3^6)^{336} \equiv 1 [7]$

$$\text{or } 3^4 \equiv 4 [7] \Rightarrow 3^{2020} \equiv 4 [7]$$

d'où $2019^{2020} \equiv 4 [7] \Rightarrow n \equiv 4 [7]$

alors $n \not\equiv 2 [7]$ alors $d \neq 7$

Concl: $\boxed{a \wedge b = 1}$

Exercice N° 17 :

(S) $\begin{cases} x \equiv -4 [19] \\ x \equiv 4 [17] \end{cases} \quad (\text{E}): 19x - 17y = 8$

1) a) on a: $19(4) - 17(4) = 8$

$\Rightarrow (4, 4)$ est une solution particulière de l'équation (E)

d'où $19x - 17y = 19(4) - 17(4)$

$$\Leftrightarrow 19(x-4) = 17(y-4)$$

$$\text{or } 19 \wedge 17 = 1 \Rightarrow \text{d'après Gauss}$$

$$19|y-4 \quad \text{et} \quad 17|x-4$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x-4 = 17k \\ y-4 = 19k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4+17k \\ y = 4+19k \end{cases}$$

Réciproquement,

$$19(4+17k) - 17(4+19k) = 8: \text{vérifié}$$

$$\Rightarrow S_{\mathbb{Z}} = \{(4+17k, 4+19k) / k \in \mathbb{Z}\}$$

$$b) n \equiv -4[19] \Leftrightarrow \text{il existe } x \in \mathbb{Z} \text{ tel que } n = -4 + 19x \quad (1)$$

$$n \equiv 4[17] \Leftrightarrow \text{il existe } y \in \mathbb{Z} \text{ tel que } n = 4 + 17y \quad (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) \rightarrow -4 + 19x = 4 + 17y$$

$$\Leftrightarrow 19x - 17y = 8$$

$$\Rightarrow (x, y): \text{solution de } (*)$$

$$c) n: \text{sol de } (S) \Leftrightarrow$$

$$n = -4 + 19x$$

$$\text{et } x = 4 + 17k \Rightarrow$$

$$n = -4 + 19(4 + 17k)$$

$$\Leftrightarrow n = -4 + 76 + 323k$$

$$\Leftrightarrow \boxed{n = 72 + 323k} \quad / k \in \mathbb{Z}$$

$$2) a) \text{ on a: } 19 \text{ premier et } 19 \text{ ne divise pas } p \text{ car } n \equiv -4[19] \Rightarrow \text{d'après}$$

$$\text{le théo de Fermat: } n^{18} \equiv 1[19]$$

$$\Leftrightarrow (n^{18})^2 \equiv 1^2[19] \Leftrightarrow \boxed{n^{36} \equiv 1[19]}$$

$$n \equiv 4[17] \Leftrightarrow n^2 \equiv 16[17] \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow n^2 \equiv -1[17] \Leftrightarrow (n^2)^{18} \equiv (-1)^{18}[17]$$

$$\Leftrightarrow \boxed{n^{36} \equiv 1[17]}$$

$$b) \begin{cases} n^{36} \equiv 1[19] \Leftrightarrow n^{36} - 1 \equiv 0[19] \\ n^{36} \equiv 1[17] \Leftrightarrow n^{36} - 1 \equiv 0[17] \end{cases}$$

$$\text{comme } 19 \wedge 17 = 1 \Rightarrow \text{d'après la conséquence du Gauss: } n^{36} - 1 \equiv 0[19 \times 17]$$

$$\Leftrightarrow n^{36} - 1 \equiv 0[323] \Leftrightarrow \boxed{n^{36} \equiv 1[323]}$$

$$3) a) \text{ on a } n \equiv -4[19]$$

$$\Rightarrow n^5 \equiv (-4)^5[19] \Leftrightarrow n^5 \equiv -2[19]$$

$$\Leftrightarrow (n^5)^6 \equiv (-2)^6[19] \Leftrightarrow \boxed{n^{30} \equiv 7[19]}$$

$$\text{et } n \equiv 4[17] \Leftrightarrow n^2 \equiv -1[17]$$

$$\Leftrightarrow (n^2)^{18} \equiv (-1)^{18}[17] \Leftrightarrow \boxed{n^{36} \equiv 1[17]}$$

$$b) n \equiv 7[19] \Leftrightarrow n^{30} \equiv 7 \cdot 76[19]$$

$$\text{car } 76 \equiv 19(-4)$$

$$\Rightarrow n^{30} \equiv -69[19] \Leftrightarrow n^{30} + 69 \equiv 0[19]$$

$$\text{et } n^{30} \equiv 1[17] \Leftrightarrow n^{30} - 1 \equiv 0[17]$$

$$\text{or } -69 \equiv 17(-4) \Rightarrow n^{30} \equiv -69[17]$$

$$\Leftrightarrow n^{30} + 69 \equiv 0[19]$$

$$\text{on a alors } \begin{cases} n^{30} + 69 \equiv 0[19] \\ n^{30} + 69 \equiv 0[17] \end{cases}$$

$$\text{comme } 19 \wedge 17 = 1 \Rightarrow n^{30} + 69 \equiv 0[19 \times 17]$$

$$\Leftrightarrow n^{30} + 69 \equiv 0[323]$$

$$\text{alors } 323: \text{divise } (n^{30} + 69)$$

$$4) a) \text{ on a } 2010 \equiv 72[323]$$

$$\Rightarrow 2010 \text{ est une solution de } (S)$$

$$b) \text{ on sait que si } n: \text{solution de } (S)$$

$$\Rightarrow n^{36} \equiv 1[323]$$

$$\text{et comme } 2010 \text{ sol de } (S)$$

$$\Rightarrow (2010)^{36} \equiv 1[323]$$

$$\Rightarrow [(2010)^{36}]^{56} \equiv 1^{56}[323]$$

$$\text{d'où } 2010^{2016} \equiv 1[323] \quad (1)$$

$$\text{et } 2010 \equiv 72[323] \Rightarrow 2010^2 \equiv 16[323]$$

$$2010^3 \equiv 483[323]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2010^5 \equiv 21[323] \\ \text{or } 2010^{2016} \equiv 1[323] \end{cases} \Rightarrow \boxed{2010^{2021} \equiv 21[323]}$$

$$c) 2010^{2022} = (2010)(2010^{2021}) \equiv 72 \times 21[323]$$

$$\text{Car: } \boxed{2010^{2022} \equiv 220[323]}$$

Exercice N° 18 :

1) a) $4 \equiv 1[3] \Rightarrow 4^n \equiv 1[3]$

b) 29 : premier
 $29 \wedge 4 = 1 \Rightarrow$ d'après Fermat
 $4^{28} \equiv 1[29]$

c) $4^0 \equiv 1[17]$
 $4^1 \equiv 4[17]$
 $4^2 \equiv 16[17]$
 $4^3 \equiv 13[17]$
 $4^4 \equiv 1[17]$

$\Rightarrow$ $4 \equiv 1[17]$ si $n=4p$
 $\Rightarrow 4[17]$ si $n=4p+1$
 $\Rightarrow 16[17]$ si $n=4p+2$
 $\Rightarrow 13[17]$ si $n=4p+3$

d) Si $n=28 \Rightarrow 4^{28} \equiv 1[3] \Rightarrow$
 $4^{28} - 1 \equiv 0[3] \Rightarrow 3$ divise $(4^{28} - 1)$
 • Si $n=28=4p \Rightarrow 4^{28} \equiv 1[17]$
 $\Rightarrow 4^{28} - 1 \equiv 0[17] \Rightarrow 17$ divise $(4^{28} - 1)$
 • $4^{28} \equiv 1[29] \Rightarrow 4^{28} - 1 \equiv 0[29] \Rightarrow$
 29 divise $(4^{28} - 1)$

alors $\{3, 17, 29\}$: 3 diviseurs
 premiers qui divisent $(4^{28} - 1)$

2) $x^{35} \equiv 2[97]$

a) on suppose que $x \wedge 97 \neq 1$
 or 97 : premier $\Rightarrow 97 \mid x$

d'où $x \equiv 0[97] \Rightarrow x^{35} \equiv 0[97]$
 absurde car $x^{35} \equiv 2[97]$
 concl : $x \wedge 97 = 1$

b) 97 : premier
 $97 \wedge x = 1 \Rightarrow$ d'après Fermat
 $x^{96} \equiv 1[97]$

on a : $x^{35} \equiv 2[97]$
 $\Rightarrow (x^{35})^{11} \equiv 2^{11}[97] \Rightarrow x^{385} \equiv 2^{11}[97]$
 or $x^{96} \equiv 1[97] \Rightarrow (x^{96})^4 \equiv 1[97]$
 $\Rightarrow x^{384} \equiv 1[97]$

d'où $x^{385} \equiv x[97] \Rightarrow x \equiv 2^{11}[97]$
 or $x^{385} \equiv 2^{11}[97]$

c) $x \equiv 2^{11}[97]$
 $2^{11} = 2048 \equiv 11[97]$
 alors 11 est le reste modulo 11 de x

3) $S_n = 1 + 5 + 5^2 + \dots + 5^n = \sum_{k=0}^n 5^k$

a) $5^0 \equiv 1[7]$
 $5^1 \equiv 5[7]$
 $5^2 \equiv 4[7]$
 $5^3 \equiv 6[7]$
 $5^4 \equiv 2[7]$
 $5^5 \equiv 3[7]$
 $5^6 \equiv 1[7]$

$\Rightarrow 5^n \equiv$
 $\rightarrow 1[7]$ si $n=6p$
 $\rightarrow 5[7]$ si $n=6p+1$
 $\rightarrow 4[7]$ si $n=6p+2$
 $\rightarrow 6[7]$ si $n=6p+3$
 $\rightarrow 2[7]$ si $n=6p+4$
 $\rightarrow 3[7]$ si $n=6p+5$

b) $S_n = \sum_{k=0}^n 5^k = \frac{1-5^{n+1}}{1-5} = \frac{5^{n+1}-1}{4}$

alors $4S_n = 5^{n+1} - 1$

c) $4S_n \equiv a[7] \Rightarrow 2(4S_n) \equiv 2a[7]$
 $\Rightarrow 8S_n \equiv 2a[7]$
 or $8 \equiv 1[7] \Rightarrow 8S_n \equiv S_n[7] \Rightarrow$
 $4S_n \equiv a[7] \Rightarrow S_n \equiv 2a[7]$
 Réciproquement, si $S_n \equiv 2a[7]$
 $\Rightarrow 4S_n \equiv 8a[7] \Rightarrow 4S_n \equiv a[7]$
 or $8a \equiv a[7]$

concl : $4S_n \equiv a[7] \Leftrightarrow S_n \equiv 2a[7]$

d) $4S_{2021} = 5^{2022} - 1$
 or $2022 = 337 \times 6 \Rightarrow 5^{2022} \equiv 1[7]$
 d'où $5^{2022} - 1 \equiv 0[7]$
 $\Rightarrow 4S_{2021} \equiv 0[7]$ d'où $S_{2021} \equiv 0[7]$
 concl : Le reste modulo 7 de S_{2021} est 0

YES WE CAN

3 BY SSIMZZ

Exercice N° 19 :

$$1) 10 \equiv 1 [9] \Rightarrow 10^{11} \equiv 1 [9]$$

$$\Rightarrow 10^{11} - 1 \equiv 0 [9]$$

$$\text{Or } 10^{24} \equiv 1 [9] \Rightarrow 10^{24} - 1 \equiv 0 [9]$$

$$2) 11m - 24n = 1$$

$$a) (10^{11n} - 1) - 10(10^{24n} - 1) = 10^{11n} - 1 - 10^{24n+1} + 10 = 9$$

$$\text{Car } 24m+1 = 11n$$

$$\text{Général : } (10^{11n} - 1) - 10(10^{24m} - 1) = 9$$

$$b) 10^{11n} - 1 = (10^{11} - 1)(10^{11(n-1)} + 10^{11(n-2)} + \dots + 10^{11} + 1)$$

$$\Rightarrow 10^{11n} - 1 = (10^{11} - 1) \cdot k$$

$$\Rightarrow (10^{11} - 1) \text{ divise } (10^{11n} - 1)$$

$$c) 10^{11n} - 1 = (10^{11} - 1)N$$

$$\text{de même } 10^{24m} - 1 = (10^{24} - 1)M$$

$$\text{Or Comme } (10^{11n} - 1) - 10(10^{24m} - 1) = 9$$

$$\Rightarrow (10^{11} - 1)N - (10^{24} - 1)M = 9$$

$$d) \begin{cases} d \mid 10^{11} - 1 \\ d \mid 10^{24} - 1 \end{cases} \Rightarrow d \mid 10^{11n} - 1 \\ d \mid 10^{24m} - 1 \Rightarrow d \mid 10^{24n} - 1$$

$$\text{alors } d \mid (10^{11} - 1)N - (10^{24} - 1)M$$

$$\Rightarrow d \mid 9$$

$$e) \text{ d'après 1°) } \begin{cases} 9 \mid 10^{24} - 1 \\ 9 \mid 10^{11} - 1 \end{cases} \Rightarrow$$

$$9 \text{ divise } (10^{24} - 1) \wedge (10^{11} - 1) \quad ①$$

$$\text{Or } (10^{24} - 1) \wedge (10^{11} - 1) \text{ divise } 9 \quad ②$$

$$① \text{ et } ② \Rightarrow (10^{24} - 1) \wedge (10^{11} - 1) = 9$$

Exercice N° 20 :

$$1) 6x - 7y = 1 \quad (E)$$

$$6 \times 6 - 7 \times 5 = 1 \Rightarrow (6, 5) \text{ sol de } (E)$$

$$\Rightarrow 6x - 7y = 6(6) - 7(5)$$

$$\Rightarrow 6(x-6) = 7(y-5)$$

$$6a = 7 \Rightarrow \text{d'après Gauss } \begin{cases} x-6 = 7k \\ y-5 = 6k \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 6 + 7k \\ y = 5 + 6k \end{cases}$$

$$\text{Réciproquement : } 6(6+7k) - 7(5+6k) = 1$$

$$\Rightarrow S_{\mathbb{Z}}^2 = \{(6+7k, 5+6k) / k \in \mathbb{Z}\}$$

$$2) (S) \begin{cases} n \equiv 1 [6] \\ n \equiv 2 [7] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n = 1 + 6x \\ n = 2 + 7y \end{cases}$$

$$\text{d'où } 1 + 6x = 2 + 7y$$

$$\Rightarrow 6x - 7y = 1 \quad (E)$$

$$\Rightarrow (x, y) \text{ sol de } (E) \Rightarrow x = 6 + 7k$$

$$\text{alors } n = 1 + 6(6+7k) = 37 + 42k$$

$$\Rightarrow S_{\mathbb{Z}} = \{37 + 42k / k \in \mathbb{Z}\}$$

$$\text{Général : } n \text{ sol de } (S) \Leftrightarrow n \equiv 37 [42]$$

$$b) 1969 = 46 \times 42 + 37 \Rightarrow 1969 \equiv 37 [42]$$

$$\Rightarrow 1969 : \text{solution de } (S)$$

$$\cdot 1969 \equiv 37 [42] \Rightarrow 1969^3 \equiv 1 [42]$$

$$\text{d'où } (1969^3)^{671} \equiv 1 [42]$$

$$\text{alors } 1969^{2013} \equiv 1 [42]$$

$$3) a) (E') : 6x - 7y = 5$$

$$6(2) - 7(1) = 12 - 7 = 5$$

$$\Rightarrow (2, 1) : \text{solution particulière de } (E')$$

$$b) (E') : 6x - 7y = 6(2) - 7(1)$$

$$\Rightarrow 6(x-2) = 7(y-1)$$

$$6a = 7 \Rightarrow \begin{cases} x-2 = 7k \\ y-1 = 6k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 + 7k \\ y = 1 + 6k \end{cases}$$

$$\text{Récip : } 6(2+7k) - 7(1+6k) = 5 \text{ vérifie}$$

$$\Rightarrow S_{\mathbb{Z}}^2 = \{(2+7k, 1+6k) / k \in \mathbb{Z}\}$$

$$3) (x, y) \text{ sol de } (E') \text{ et } d = \text{pgcd}$$

$$a) d \mid x \Rightarrow d \mid 6x - 7y \Leftrightarrow d \mid 5$$

$$d \mid y$$

$$\Rightarrow d \in D_S = \{1, 5\}$$

$$\text{cmf : } \boxed{d=1} \text{ ou } \boxed{d=5}$$

$$b) (x, y) : \text{tel } d \in (E') / d=1$$

$$\Rightarrow \text{il faut que } y \neq 0[5]$$

$$\Leftrightarrow 1+6k \neq 0[5] \Leftrightarrow 6k \neq -1[5]$$

$$\Leftrightarrow k \neq 4[5]$$

d'après les solutions de (E') tel que $d=1$

$$\text{soit : } \{(2+7k, 1+6k) / k \in \mathbb{Z} \text{ et } k \neq 4+5p\}$$

$$e) d=5 \Rightarrow y=0[5] \Leftrightarrow$$

$$1+6k \equiv 0[5] \Leftrightarrow 6k \equiv -1[5]$$

$$\Leftrightarrow k=4[5] \Rightarrow k=4+5p$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x=2+7(4+5p) \\ y=1+6(4+5p) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=30+35p \\ y=25+30p \end{cases}$$

$\Rightarrow$ les solutions de (E') tel que $d=5$

$$\text{soit : } \{(30+35p, 25+30p) / p \in \mathbb{Z}\}$$

$$5) \begin{cases} 6a-7b=5 & (1) \\ a \wedge b=5 & (2) \\ a \vee b=150 \end{cases}$$



$$(1) \& (2) \Rightarrow \begin{cases} a=30+35p \\ b=25+30p \end{cases}$$

$$\text{or } ab = (a \wedge b) \cdot (a \vee b)$$


$$\Rightarrow ab = 5 \times 150 = 750$$

$$\Leftrightarrow (30+35p)(25+30p) = 750$$

$$\Rightarrow p=0 \Rightarrow (a, b) = (30, 25)$$



Probabilité



Jacques Bernoulli
1654 - 1705

Exercice N° 21 :

200 Romans $\begin{cases} 150 \text{ policiers} \rightarrow 40\% \text{ Français} \\ 50 \text{ romans} \rightarrow 70\% \text{ Français} \end{cases}$

1) Le lecteur choisit un roman policier
 $\Rightarrow P_1 = \frac{150}{200} = 0,75 \Rightarrow \boxed{b}$

2) Le lecteur choisit un écrivain français sachant qu'il a choisi policier
 $\Rightarrow P_2 = 40\% = 0,4 \Rightarrow \boxed{c}$

3) Le lecteur choisit un roman policier issu d'un écrivain français
 $\Rightarrow P_3 = P(P \cap F) = P(P) \cdot P(F|P)$
 $= 0,75 \times 0,4 = 0,3 \Rightarrow \boxed{c}$

4) Le lecteur choisisse un écrivain Français

$$\Rightarrow P_4 = P(F) = P(P \cap F) + P(R \cap F) \\ = P(P) \cdot P(F|P) + P(R) \cdot P(F|R) \\ = \frac{3}{4} \times 0,14 + \frac{1}{4} \times 0,17$$

$$P_4 = 0,1475 \Rightarrow \boxed{C}$$

5) Le lecteur ait choisi un Policier sachant que l'écrivain est Français

$$\Rightarrow P_5 = P(P|F) = \frac{P(P \cap F)}{P(F)} = \frac{P_4}{P_4}$$

$$\Rightarrow P_5 = \frac{0,13}{0,1475} = \frac{12}{19} \Rightarrow \boxed{E}$$

6) Le lecteur est venu 20 fois

Si le lecteur a choisi au moins une fois un roman Policier

$\bar{S}$: le lecteur n'a choisi aucune fois un roman Policier

$$\Rightarrow P(\bar{S}) = [P(R)]^{20} = \left(\frac{1}{4}\right)^{20} = (0,25)^{20}$$

$$\text{donc } P_6 = 1 - P(\bar{S})$$

$$\Rightarrow P_6 = 1 - (0,25)^{20} \Rightarrow \boxed{A}$$

Exercice N° 22 :


Le 1^{er} jour, la ville est délestée

• Si un jour est délestée $\Rightarrow$ la proba pour qu'elle soit délestée le lendemain est $\frac{2}{9}$

• Si elle n'est pas délestée un jour $\Rightarrow$ la proba qu'elle soit délestée le lendemain est $\frac{5}{6}$

D_n : "la ville est délestée le jour n"

1) a) L'arbre de probabilité relatif aux 3 premiers jours



b) soit l'événement:

A: la ville est délestée les 3 jours

$$\Rightarrow A = D_1 \cap D_2 \cap D_3$$

$$\Rightarrow P(A) = P(D_1) \cdot P(D_2|D_1) \cdot P(D_3|D_2)$$

$$\Rightarrow P(A) = 1 \times \frac{2}{9} \times \frac{2}{9}$$

$$\text{Concl.} \quad \boxed{P(A) = \frac{4}{81}}$$

1) X: le Nbre de fois où la ville est délestée les 3 premiers jours

$$a) X=2 \Leftrightarrow (D_1 \cap D_2 \cap \bar{D}_3) \cup (\bar{D}_1 \cap \bar{D}_2 \cap D_3)$$

$$\Rightarrow P(X=2) = P(D_1) \cdot P(D_2|D_1) \cdot P(\bar{D}_3|D_2) + P(\bar{D}_1) \cdot P(\bar{D}_2|\bar{D}_1) \cdot P(D_3|\bar{D}_2)$$

$$\text{alors } P(X=2) = \left(1 \times \frac{2}{9} \times \frac{7}{9}\right) + \left(1 \times \frac{7}{9} \times \frac{5}{6}\right)$$

$$\Rightarrow P(X=2) = \frac{14}{81} + \frac{35}{54} = \frac{133}{162}$$

$$b) X(\omega) = \{1, 2, 3\}$$

$$\begin{aligned} P(X=1) &= P(\bar{D}_1 \cap \bar{D}_2 \cap \bar{D}_3) \\ &= P(\bar{D}_1) \cdot P(\bar{D}_2|\bar{D}_1) \cdot P(\bar{D}_3|\bar{D}_2) \\ &= 1 \times \frac{7}{9} \times \frac{1}{6} = \frac{7}{54} = \frac{21}{162} \end{aligned}$$


$$P(X=2) = \frac{133}{162}$$

$$P(X=3) = P(A) = \frac{4}{81} = \frac{8}{162}$$


d'où la loi de proba de X est:

$X=X_i$	1	2	3	Σ
$P(X=X_i)$	$\frac{21}{162}$	$\frac{133}{162}$	$\frac{8}{162}$	1

$$2) \text{ Mg } \forall n \in \mathbb{N}^* \quad P_{n+1} = \frac{11}{18} P_n + \frac{5}{6}$$



L'arbre de proba relatif aux
n^e et (n+1)^e jour :



$$\text{donc } D_{n+1} = (D_n \cap D_{n+1}) \cup (\bar{D}_n \cap D_{n+1})$$

Comme $(D_n \cap D_{n+1})$ et $(\bar{D}_n \cap D_{n+1})$ sont
2 événements incompatibles $\Rightarrow$

$$P(D_{n+1}) = P(D_n \cap D_{n+1}) + P(\bar{D}_n \cap D_{n+1})$$

$$\Rightarrow P(D_{n+1}) = P(D_n) \cdot P(D_{n+1}|D_n) + P(\bar{D}_n) \cdot P(D_{n+1}|\bar{D}_n)$$

$$\Rightarrow P_{n+1} = (P_n) \left(\frac{2}{9}\right) + (1-P_n) \left(\frac{5}{6}\right)$$

$$\Rightarrow P_{n+1} = P_n \left(\frac{2}{9} - \frac{5}{6}\right) + \frac{5}{6}$$

$$\text{donc : } \forall n \in \mathbb{N}^*, \boxed{P_{n+1} = -\frac{11}{18} P_n + \frac{5}{6}}$$

$$3) V_n = 6P_n + \alpha$$

$$a) V_n \text{ suite géo } \Rightarrow V_{n+1} = qV_n$$

$$\text{or } V_{n+1} = 6P_{n+1} + \alpha = 6 \left[-\frac{11}{18} P_n + \frac{5}{6} \right] + \alpha$$

$$\Rightarrow V_{n+1} = -\frac{11}{3} P_n + 5 + \alpha$$

$$\text{or } P_n = \frac{V_n - \alpha}{6}$$

$$\Rightarrow V_{n+1} = -\frac{11}{3} \left(\frac{V_n - \alpha}{6} \right) + 5 + \alpha$$

$$\Rightarrow V_{n+1} = -\frac{11}{18} V_n + \left(\frac{29}{18} \alpha + 5 \right)$$

$$\text{donc } V_n \text{ SG } \Leftrightarrow \frac{29}{18} \alpha + 5 = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\alpha = -\frac{90}{29}}$$

$$\text{donc Si } \alpha = -\frac{90}{29} \Rightarrow V_n \text{ st une}$$

$$\text{suite géo de raison } q = -\frac{11}{18}$$

$$\text{et de premier terme } V_1 = 6P_1 + \alpha$$

$$\text{or } P_1 = 1 \Rightarrow V_1 = 6 - \frac{90}{29} = \frac{84}{29}$$

$$b) V_n = V_1 \cdot q^{n-1} \Rightarrow \boxed{V_n = \frac{84}{29} \left(-\frac{11}{18} \right)^{n-1}}$$

$$P_n = \frac{1}{6} V_n - \frac{1}{6} \alpha = \frac{1}{6} \left(\frac{84}{29} \right) \left(-\frac{11}{18} \right)^{n-1} - \frac{1}{6} \left(-\frac{90}{29} \right)$$

$$\Rightarrow \boxed{P_n = \frac{14}{29} \left(-\frac{11}{18} \right)^{n-1} + \frac{15}{29}} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

c) Soit S: "les habitants suivent
le match sans délestage"

$$\Rightarrow P(S) = P_{20} = 1 - P_{20}$$

$$\Rightarrow P(S) = 1 - \left(\frac{14}{29} \right) \left(-\frac{11}{18} \right)^{19} - \frac{15}{29}$$

$$\Rightarrow P(S) \approx 0,483$$

$$\boxed{P(S) = 48,3\%}$$

Exercice N° 23 :

• 80% : respectent le panneau "STOP"

• 30% de ceux qui ne le respectent pas
ont eu un accident

• 95% de ceux qui le respectent
n'ont pas eu d'accident

R: l'automobiliste a respecté

A: l'automobiliste a eu un accident

$$1) a) P(\bar{R}) = 1 - P(R) = 1 - 80\% = 0,2$$


• A|R: il a eu un accident
sachant qu'il n'a pas
respecté le panneau

$$\Rightarrow P(A|R) = 30\% = 0,3$$

• A|\bar{R}: il n'a pas eu d'accident
sachant qu'il a respecté le panneau

$$\Rightarrow P(A|\bar{R}) = 95\% = 0,95$$

b) L'arbre de proba reflétant la
situation :



$$\text{donc } A = (R \cap A) \cup (\bar{R} \cap A)$$

Comme $(R \cap A)$ et $(\bar{R} \cap A)$ incompatibles

$$\Rightarrow P(A) = P(R) \cdot P(A|R) + P(\bar{R}) \cdot P(A|\bar{R})$$

$$\Rightarrow P(A) = (0,8)(0,05) + (0,2)(0,3)$$

$$\Rightarrow P(A) = 0,1 = \frac{1}{10}$$

$$2) P(\bar{R}|A) = \frac{P(\bar{R} \cap A)}{P(A)} = \frac{(0,2)(0,3)}{0,1} = 0,6$$

3) 8 automobilistes arrivent à ce carrefour

On considère la variable aléatoire :

Y : le Nbre d'accident provoqué par ces 8 automobilistes

on a alors :
 1) répétition "indépendants"
 2) chaque véhicule $\left\{ \begin{array}{l} \text{Succès : a eu un accident} \\ \text{Echec : n'a pas eu d'accident} \end{array} \right.$
 3) $P(A)$: reste constante

$\Rightarrow Y$: obéit à la loi binomiale de paramètres : $n=8$ et $p=P(A)=0,1$

d'où $Y(\omega) = \{0, 1, 2, \dots, 8\}$

$$P(X=k) = \binom{8}{k} (0,1)^k (0,9)^{8-k}$$

$$a) P(Y \geq 1) = 1 - P(Y=0) = 1 - (0,9)^8$$

$$\begin{aligned} b) P(Y \leq 2) &= P(Y=0) + P(Y=1) + P(Y=2) \\ &= (0,9)^8 + \binom{8}{1} (0,1)(0,9)^7 + \binom{8}{2} (0,1)^2 (0,9)^6 \\ &= (0,9)^6 \left[(0,9)^2 + 8(0,1)(0,9) + \binom{8}{2} (0,1)^2 \right] \\ &\Rightarrow P(Y \leq 2) \approx 0,962 \end{aligned}$$

4) durant juin : 32 000 voitures passent par ce carrefour
 Le nombre moyen d'accident en juin
 $N = (32000) \cdot P(A) = 3200$

Exercice N° 24 :

14% présentent le défaut D_1

10% présentent le défaut D_2

4% présentent les défauts D_1 et D_2

D_1 : L'appareil présente le défaut D_1

D_2 : " " " " " " " " D_2

1) on sait que $P(D_1) = 0,14$

$$\text{et } P(D_2) = 0,1 \text{ et } P(D_1 \cap D_2) = 0,04$$

$$\text{or } P(D_1) \cdot P(D_2) = (0,14)(0,1) = 0,014$$

$$P(D_1 \cap D_2) = 0,04$$

$$\text{d'où } P(D_1 \cap D_2) \neq P(D_1) \cdot P(D_2)$$

alors D_1 et D_2 : ne sont pas indépendants

$$2) P(D_2|D_1) = \frac{P(D_2 \cap D_1)}{P(D_1)} = \frac{0,04}{0,14} = \frac{2}{7}$$

3) L'appareil est défectueux s'il a au moins 1 défaut $\Rightarrow D_1 \cup D_2$

$$\Rightarrow P(D) = P(D_1 \cup D_2) = P(D_1) + P(D_2) - P(D_1 \cap D_2)$$

$$\Rightarrow P(D) = (0,14) + (0,1) - (0,04) = 0,2 = \frac{1}{5}$$

4) Le commerçant reçoit n appareils

X : le nombre d'appareils défectueux

a) on a :
 1) répétition "indépendants"
 2) chaque appareil $\left\{ \begin{array}{l} \text{Succès : } D \\ \text{Echec : } \bar{D} \end{array} \right.$
 3) $P(D)$: reste constante

$\Rightarrow X$: obéit à la loi binomiale de paramètres n et $p=P(D)=\frac{1}{5}$

d'où la loi de probabilité de X

en : $X(\omega) = \{0, 1, 2, \dots, n\}$

$$P(X=k) = \binom{n}{k} \left(\frac{1}{5}\right)^k \left(\frac{4}{5}\right)^{n-k}$$

$$b) E(X) = np = n\left(\frac{1}{5}\right) = \frac{n}{5}$$

$$V(X) = np(1-p) = n\left(\frac{1}{5}\right)\left(\frac{4}{5}\right) = \frac{4n}{25}$$

c) Soit P_n : la proba d'avoir au moins 1 appareil défectueux

$$\Rightarrow P_n = P(X \geq 1) = 1 - P(X=0)$$

$$\Rightarrow P_n = 1 - \left(\frac{4}{5}\right)^n$$

$$P_n \leq 50\% \Rightarrow 1 - \left(\frac{4}{5}\right)^n \leq 0,5$$

$$\Rightarrow \left(\frac{4}{5}\right)^n \geq 0,5 \Rightarrow n \geq \frac{\ln(0,5)}{\ln(0,8)} \approx 2$$

$$\ln 7 \Rightarrow n \ln\left(\frac{4}{5}\right) \geq -\ln 2$$

$$\text{d'où } n \leq \frac{-\ln 2}{\ln\left(\frac{4}{5}\right)} \approx 3,106$$

d'où le nombre maximal qu'il doit commander est $\boxed{n=3}$

Exercice N° 25 :


2V
3J $\xrightarrow{\text{tirer}}$ 2 boules

- Urne
- s'il obtient 2 couleurs différents $\Rightarrow$ Perdu
 - s'il tire 2 boules jaunes $\Rightarrow$ remboursé
 - s'il tire 2 boules vertes, il fait tourner une roue de chance et il gagne $\begin{cases} 100^d \\ 20^d \\ \text{remboursé} \end{cases}$
 - V : le joueur tire 2 boules vertes
 - J : " " " jaunes
 - R : " " soit remboursé
 - G_{100} : " " a reçu 100^d
 - G_{20} : " " a reçu 20^d

$$1/a) P(V) = \frac{C_2^2}{C_2^5} = \frac{1}{10}$$

$$P(J) = \frac{C_2^3}{C_2^5} = \frac{3}{10}$$

b) L'arbre de la probabilité qui modélise la situation :



$$c) R = (R \cap V) \cup (R \cap J)$$

$$\Rightarrow P(R) = P(V) \cdot P(R|V) + P(J) \cdot P(R|J)$$

$$= \left(\frac{1}{5} \times \frac{3}{4}\right) + \left(\frac{3}{5} \times 1\right) = \frac{29}{50}$$

2) X : le gain algébrique du joueur

$$a) X(\omega) = \{-m, 0, 20-m, 100-m\}$$

$$a) P(X = -m) = P(\overline{VJ}) = 1 - P(V) - P(J)$$

$$= \frac{6}{10} = 0,6 = \frac{48}{80}$$

$$\bullet P(X = 0) = P(R) = \frac{29}{50}$$

$$\bullet P(X = 20-m) = P(V) \cdot P(G_{20}|V) = \frac{1}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{2}{80}$$

$$\bullet P(X = 100-m) = P(V) \cdot P(G_{100}|V) = \frac{1}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{80}$$

d'où la loi de proba de X est

$x = x_i$	-m	0	20-m	100-m	Σ
$P(X=x_i)$	$\frac{48}{80}$	$\frac{29}{80}$	$\frac{2}{80}$	$\frac{1}{80}$	1
$x_i P(x_i)$	$-\frac{48m}{80}$	0	$\frac{40-2m}{80}$	$\frac{100-m}{80}$	$\frac{140-51m}{80}$

$$b) E(X) = \sum x_i P(X=x_i) = \frac{140-51m}{80}$$

c) L'organisateur gagne de l'argent lorsque $E(X) < 0 \Rightarrow$ le joueur perd

$$\text{d'où } 140 - 51m < 0 \Leftrightarrow$$

$$51m > 140 \Rightarrow m > \frac{140}{51}$$

$$\Rightarrow \boxed{m > 2,745}$$

3) G : le joueur s'il doit rembourser soit il gagne.

$$\text{et } P(G) \geq \frac{1}{2}$$

L'urne contient $\begin{matrix} 2V \\ nJ \end{matrix}$

$$\Rightarrow P(V) = \frac{C_2^2}{C_2^{n+2}} = \frac{1}{(n+2)(n+1)} = \frac{2}{(n+2)(n+1)}$$

$$P(J) = \frac{C_2^n}{C_2^{n+2}} = \frac{n(n-1)}{(n+2)(n+1)}$$

$\bar{G}$: le joueur perd $\Leftrightarrow$ le joueur tire 1 boule J et 1 boule V

$$\Rightarrow P(\bar{G}) = \frac{C_1^2 C_1^n}{C_2^{n+2}} = \frac{2n}{(n+2)(n+1)}$$

$$\Leftrightarrow P(\bar{G}) = \frac{4n}{(n+2)(n+1)}$$

$$\text{alors } P(G) = 1 - \frac{4n}{(n+2)(n+1)} = \frac{n^2 - n + 2}{(n+2)(n+1)}$$

$$P(G) > \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{n^2 - n + 2}{n^2 + 3n + 2} > \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow 2(n^2 - n + 2) > n^2 + 3n + 2$$

$$\Leftrightarrow 2n^2 - 2n + 4 > n^2 + 3n + 2$$

$$\Leftrightarrow n^2 - 5n + 2 > 0$$

$$\Delta = 25 - 8 = 17$$

$$n' = \frac{5 - \sqrt{17}}{2} \approx 0,144$$

$$n'' = \frac{5 + \sqrt{17}}{2} \approx 4,56$$

n	0	n'	n''	too
$n^2 - 5n + 2$	-	+	+	+

Comme $n \geq 2 \Rightarrow$

puisque $P(G) > \frac{1}{2}$ il faut que

$$n > n'' \approx 4,56$$

$$\text{alors } n \geq 5$$

Concl : Pour que $P(G) > \frac{1}{2}$

$\Rightarrow$ la valeur minimal de boules
jeu ≥ 5

Exercice N° 26 :

2B	3B
4R	2R

U_1

U_2

on tire 1 boule de U_1 et 1 boule de U_2

1) A : obtenir 2 boules même couleur

$\Rightarrow$ A : obtenir BB ou RR

$$\Rightarrow P(A) = \left(\frac{2}{6} \times \frac{3}{5}\right) + \left(\frac{4}{6} \times \frac{2}{5}\right) = \frac{7}{15}$$

• B : obtenir au moins 1 Blanche

$\bar{B}$: n'obtenir aucune B $\Rightarrow$ obt. RR

$$\Rightarrow P(\bar{B}) = \frac{4}{6} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{15}$$

$$\text{alors } P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - \frac{4}{15} = \frac{11}{15}$$

b) S : obtenir R de U_1 sachant qu'on
a obtenu 2 couleurs différents

$\Leftrightarrow$ S : obtenir R de U_1 et B de U_2

$$\Rightarrow P(S) = \frac{4}{6} \times \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$$

2) X : le nombre de boules Blanches obtenues

$$a) X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$$

• $X=0$: obtenir RR

$$\Rightarrow P(X=0) = \frac{4}{6} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{15}$$

• $X=1$: obtenir RB ou BR

$$\Rightarrow P(X=1) = \frac{4}{6} \times \frac{3}{5} + \frac{2}{6} \times \frac{2}{5} = \frac{8}{15}$$

• $X=2$: obtenir BB

$$\Rightarrow P(X=2) = \frac{2}{6} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{15}$$

d'où la loi de proba de X est :

$x = x_i$	0	1	2	Σ
$P(X=x_i)$	$\frac{4}{15}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{3}{15}$	1
$x_i P(X=x_i)$	0	$\frac{8}{15}$	$\frac{6}{15}$	$\frac{14}{15}$
$(x_i)^2 P(X=x_i)$	0	$\frac{8}{15}$	$\frac{12}{15}$	2

$$b) E(X) = \sum x_i P(X=x_i) = \frac{14}{15}$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 2 - \left(\frac{14}{15}\right)^2$$

$$\Rightarrow V(X) = \frac{254}{225}$$

3) on répète l'épreuve 5 fois
on considère la variable aléatoire

Z : le nombre de fois où "A" réussit
- Répétition indépendante
- Chaque épreuve a une proba de succès $P(A)$ et de échec $1 - P(A)$
- $P(A)$: reste constante

$\Rightarrow Z$: obéit à la loi binomiale de
paramètres $n=5$, $P=P(A)=\frac{7}{15}$

$$\text{d'où } Z(\Omega) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$P(Z=k) = C_5^k \left(\frac{7}{15}\right)^k \left(\frac{8}{15}\right)^{5-k}$$

$$\bullet P(F) = P(Z=3) = C_5^3 \left(\frac{7}{15}\right)^3 \left(\frac{8}{15}\right)^2$$

• G : obtenir A A A A R

$$\Rightarrow P(G) = P(A) \cdot P(A) \cdot P(A) \cdot P(A) \cdot P(R) = \left(\frac{7}{15}\right)^4 \left(\frac{8}{15}\right)$$

• H : au plus 2 fois A $\Rightarrow Z \leq 2$

$$\Rightarrow P(H) = P(Z \leq 2) = P(Z=0) + P(Z=1) + P(Z=2)$$

$$P(H) = \left(\frac{8}{15}\right)^5 + \binom{1}{5} \left(\frac{2}{15}\right) \left(\frac{8}{15}\right)^4 + \binom{2}{5} \left(\frac{2}{15}\right)^2 \left(\frac{8}{15}\right)^3$$

$$\Rightarrow P(H) = \left(\frac{8}{15}\right)^5 + 5 \left(\frac{2}{15}\right) \left(\frac{8}{15}\right)^4 + 10 \left(\frac{2}{15}\right)^2 \left(\frac{8}{15}\right)^3$$

II on tire 1 boule de U_1

* Si B on la garde et on tire 1 boule de U_1

* Si B on la met dans U_2 et on tire successivement sans remise 2 boules de U_2

Y : le nombre de boules blanches obtenues au cours de cette épreuve.

$$Y(\omega) = \{0, 1, 2\}$$

• pm $Y=0$: obtenir R de U_1 et 2 R de U_2

$$\Rightarrow P(Y=0) = \frac{4}{6} \times \left(\frac{2}{6} \times \frac{2}{5}\right) = \frac{2}{15}$$

• pm $Y=1$: obtenir R de U_1 et (R ou B) de U_2

ou B de U_1 puis R de U_1

$$\Rightarrow P(Y=1) = \frac{4}{6} \times 2 \left(\frac{2}{6} \times \frac{3}{5}\right) + \frac{2}{6} \times \frac{4}{5} = \frac{10}{15}$$

• pm $Y=2$: obtenir B de U_1 puis B de U_1


ou R de U_1 et 2 B de U_2

$$\Rightarrow P(Y=2) = \frac{2}{6} \times \frac{1}{5} + \frac{4}{6} \times \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{3}{15}$$

d'où la loi de proba de Y est:

$Y=y_i$	0	1	2	Σ
$P(Y=y_i)$	$\frac{2}{15}$	$\frac{10}{15}$	$\frac{3}{15}$	1

Suites Réelles



Exercice N° 27 :

$$1) U_0 = \frac{1}{2}; U_{n+1} = \frac{3}{2} - \frac{1}{U_n + 1}$$

$$a) \text{ M.A } \forall n \in \mathbb{N} \quad \frac{1}{2} \leq U_n \leq 1$$

$$\text{pm } n=0, U_0 = \frac{1}{2} \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] : \text{vérifier}$$

$$\text{supposons } \frac{1}{2} \leq U_n \leq 1 \text{ vrai}$$

$$\text{M.A } \frac{1}{2} \leq U_{n+1} \leq 1$$

$$\text{En effet: } \frac{1}{2} \leq U_n \leq 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} \leq U_n \leq 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \leq 1 + U_n \leq 2 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq \frac{1}{1 + U_n} \leq \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2} \leq \frac{-1}{1 + U_n^2} \leq -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \leq \frac{3}{2} - \frac{1}{1 + U_n^2} \leq 1$$

$$\text{d'où } \frac{1}{2} \leq U_{n+1} \leq 1$$

$$\text{lim: } \forall n \in \mathbb{N}, \quad \frac{1}{2} \leq U_n \leq 1$$

$$b) U_{n+1} - U_n = \frac{3}{2} - \frac{1}{U_n^2 + 1} - U_n = \frac{3(U_n^2 + 1) - 2 - 2U_n(U_n^2 + 1)}{2(U_n^2 + 1)}$$

$$\Rightarrow U_{n+1} - U_n = \frac{3U_n^2 - 2U_n^3 - 2U_n + 1}{2(U_n^2 + 1)}$$

$$\Rightarrow U_{n+1} - U_n = \frac{(U_n - 1)(-2U_n^2 + U_n - 1)}{2(U_n^2 + 1)}$$

$$c) \text{ on a } \forall n \in \mathbb{N} \quad -2U_n^2 + U_n - 1 < 0$$

$$\text{car } \Delta = 1 - 8 < 0$$

$$\text{et } U_n \leq 1 \Rightarrow U_n - 1 \leq 0$$

$$\Rightarrow \text{then } U_{n+1} - U_n \geq 0 \Rightarrow U_n \uparrow$$

$$\text{et } U_n \text{ majorée par } 1 \Rightarrow$$

$$U_n \text{ converge et converge vers } l$$

$$\text{determiner } l:$$

$$\text{on pose } f(x) = \frac{3}{2} - \frac{1}{x^2 + 1} \Rightarrow D_S = \mathbb{R}$$

$$\text{ma alors } \begin{cases} U_{n+1} = f(U_n) \\ U_n \text{ converge vers } l \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] \\ f \in \text{mon } \left[\frac{1}{2}, 1\right] \text{ CIP} \end{cases}$$

$$\Rightarrow l \text{ est la solution de l'équation}$$

$$f(l) = l \Leftrightarrow \frac{3}{2} - \frac{1}{l^2 + 1} = l \Leftrightarrow$$

$$3(l^2 + 1) - 2 = 2l(l^2 + 1)$$

$$\Leftrightarrow 3l^3 - 3l^2 + 2l - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow (l - 1)(2l^2 - l + 1) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} l - 1 = 0 \Rightarrow l = 1 \\ \text{ou} \\ 2l^2 - l + 1 = 0 \end{cases}$$

$$\Delta = 1 - 8 < 0 \Rightarrow \text{pas de solution}$$

$$\text{et } U_n \text{ converge vers } 1$$

2) a) $\forall n \in \mathbb{N} \quad |U_{n+1} - 1| \leq \frac{4}{5} |U_n - 1|$
 ou $U_n \leq 1 \Rightarrow |U_{n+1} - 1| = 1 - U_{n+1}$
 et $|U_n - 1| = 1 - U_n$

d'où $|U_{n+1} - 1| = \frac{4}{5} |U_n - 1| = (1 - U_{n+1}) \cdot \frac{4}{5} (1 - U_n)$

$= \frac{1}{5} - \left(\frac{4}{5} - \frac{1}{U_{n+1}}\right) + \frac{4}{5} U_n$

$= \frac{-13}{10} + \frac{1}{U_{n+1}} + \frac{4}{5} U_n \Leftrightarrow$

$= \frac{-13(U_n^2 + 1) + 10 + 8 U_n (U_n + 1)}{10(U_n^2 + 1)}$

$= \frac{8U_n^2 - 13U_n^2 + 8U_n - 3}{10(U_n^2 + 1)}$

$= \frac{(U_n - 1)(8U_n^2 - 5U_n + 3)}{10(U_n^2 + 1)} \leq 0$

et $U_n - 1 \leq 0$ car $\frac{1}{2} \leq U_n \leq 1$

et $8U_n^2 - 5U_n + 3 > 0$

car $\Delta = 25 - 96 = -71 < 0$

$\Rightarrow |U_{n+1} - 1| \leq \frac{4}{5} |U_n - 1|$

b) Mq $\forall n \in \mathbb{N} \quad |U_n - 1| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{4}{5}\right)^n$

pm $n=0, |U_0 - 1| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{4}{5}\right)^0$ vérifie

supp $|U_n - 1| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{4}{5}\right)^n$ vraie

Dq $|U_{n+1} - 1| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}$

en efft $|U_{n+1} - 1| \leq \frac{4}{5} |U_n - 1|$

et $|U_n - 1| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{4}{5}\right)^n$

$\Rightarrow |U_{n+1} - 1| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}$

Concl: $\forall n \in \mathbb{N} \quad |U_n - 1| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{4}{5}\right)^n$

c) $\frac{4}{5} \in]-1, 1[\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{5}\right)^n = 0$

d'où $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(\frac{4}{5}\right)^n = 0$

alors $\lim_{n \rightarrow \infty} (U_n - 1) = 0 \Leftrightarrow \boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = 1}$

3) $S_n = \sum_{k=0}^{n-1} (1 - U_k)$

$S_{n+1} - S_n = \sum_{k=0}^n (1 - U_k) - \sum_{k=0}^{n-1} (1 - U_k)$

$= 1 - U_n \geq 0 \Rightarrow S_n \nearrow$

• ou $1 - U_n \leq \frac{1}{2} \left(\frac{4}{5}\right)^n$

$\Rightarrow \sum_{k=0}^{n-1} (1 - U_k) \leq \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{4}{5}\right)^k$

$\Rightarrow S_n \leq \frac{1}{2} \left[\frac{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^n}{1 - \frac{4}{5}} \right]$

$\Rightarrow S_n \leq \frac{1}{2} \left[\frac{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^n}{\frac{1}{5}} \right]$

$\Rightarrow S_n \leq \frac{5}{2} \left[1 - \left(\frac{4}{5}\right)^n \right] \leq \frac{5}{2}$

alors $S_n \nearrow$ et majorée par $\frac{5}{2}$

d'où S_n est convergente

Exercice N° 28 :

1) $G(x) = \int_0^x \frac{t}{1+t^4} dt \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$F(x) = G(\sqrt{\tan x}) \quad \forall x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$

2) on pose $g(t) = \frac{t}{1+t^4} \in \mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$

$\Rightarrow G$ est la primitive sur $\mathbb{R}$ de g

qui s'annule en 0

on a donc $\begin{cases} 1) G \in \mathcal{C}^1 \text{ sur } \mathbb{R} \\ 2) G'(x) = g(x) = \frac{x}{1+x^4} \\ 3) G(0) = 0 \end{cases}$

$F(x) = G(\sqrt{\tan x})$

et $x \mapsto \sqrt{\tan x} \in \mathcal{C}^1$ sur $]0, \frac{\pi}{2}[$

et $\sqrt{\tan x} \in]0, +\infty[\subset \mathbb{R} = \mathcal{D}_G \subset \mathbb{C}$

$\Rightarrow F$ est dérivable sur $]0, \frac{\pi}{2}[$

$F'(x) = (\sqrt{\tan x})' \cdot G'(\sqrt{\tan x}) =$

$= \frac{1 + \tan^2 x}{2\sqrt{\tan x}} \cdot \frac{\sqrt{\tan x}}{1 + (\sqrt{\tan x})^4} = \frac{1}{2}$

b) $F'(x) = \frac{1}{2} \Rightarrow F(x) = \frac{1}{2}x + k$

et $F(0) = G(0) = 0 \Rightarrow k = 0$

$F(x) = \frac{1}{2}x$

Concl: $\forall x \in]0, \frac{\pi}{2}[\quad \boxed{F(x) = \frac{1}{2}x}$

• $\int_0^1 \frac{t}{1+t^4} dt = G(1) - G(0) = G(1)$

$= F\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{8}$

2) a) $J = \int_0^1 \frac{t^5}{(1+t^4)^2} dt = \int_0^1 \left(\frac{t^3}{(1+t^4)^2} \right) dt$

on pose $u(t) = t^2 \rightarrow u'(t) = 2t$

$v'(t) = \frac{t^3}{(1+t^4)^2} \rightarrow v(t) = -\frac{1}{4} \left(\frac{1}{1+t^4} \right)$

$\Rightarrow J = \left[-\frac{t^2}{4(1+t^4)} \right]_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{t}{1+t^4} dt$

$= -\frac{1}{8} + \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{8} \right) \Rightarrow J = \frac{\pi-2}{16}$

$$3) n \in \mathbb{N}, I_n = \int_0^1 \frac{t^{4n+1}}{1+t^4} dt$$

$$a) \text{ On } 0 \leq I_n \leq \frac{1}{4n+2}$$

$$\text{car } 0 \leq t \leq 1 \Rightarrow 0 \leq t^4 \leq 1$$

$$\text{donc } 1 \leq 1+t^4 \leq 2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \leq \frac{1}{1+t^4} \leq 1 \text{ et } t^{4n+1} \geq 0$$

$$\Rightarrow 0 \leq \frac{t^{4n+1}}{1+t^4} \leq t^{4n+1}$$

$$\text{alors } 0 \leq \int_0^1 \frac{t^{4n+1}}{1+t^4} dt \leq \int_0^1 t^{4n+1} dt$$

$$\Rightarrow 0 \leq I_n \leq \left[\frac{t^{4n+2}}{4n+2} \right]_0^1$$

$$\Rightarrow 0 \leq I_n \leq \frac{1}{4n+2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4n+2} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 0$$

$$b) I_{n+1} + I_n = \int_0^1 \frac{t^{4n+5}}{1+t^4} dt + \int_0^1 \frac{t^{4n+1}}{1+t^4} dt$$

$$= \int_0^1 \frac{t^{4n+5} + t^{4n+1}}{1+t^4} dt = \int_0^1 \frac{t^{4n+1}(t^4 + 1)}{(1+t^4)} dt$$

$$= \left[\frac{1}{4n+2} t^{4n+2} \right]_0^1 = \frac{1}{4n+2}$$

$$\Rightarrow I_{n+1} + I_n = \frac{1}{4n+2}$$

$$\text{pour } n=0, I_1 + I_0 = \frac{1}{2}$$

$$\text{et } I_0 = \int_0^1 \frac{t}{1+t^4} dt = \frac{\pi}{8}$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{1}{2} - I_0 = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{8}$$

$$\text{Pour } n=1: I_2 + I_1 = \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{1}{6} - I_1 = \frac{1}{6} - \left(\frac{1}{2} - \frac{\pi}{8} \right)$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{3}$$

$$4) \forall n \in \mathbb{N} \quad S_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{4k+2}$$

$$a) \text{ On } \forall n \in \mathbb{N}, S_n = \frac{\pi}{8} + (-1)^n I_{n+1}$$

$$\text{Pour } n=0, S_0 = \frac{(-1)^0}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\text{et } S_0 = \frac{\pi}{8} + I_1 = \frac{\pi}{8} + \left(\frac{1}{2} - \frac{\pi}{8} \right) = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \text{vérifiée pour } n=0$$

$$\text{Supposons } S_n = \frac{\pi}{8} + (-1)^n I_{n+1} \text{ vrai}$$

$$\text{D'où } S_{n+1} = \frac{\pi}{8} + (-1)^{n+1} I_{n+2}$$

$$\text{en effet, } S_{n+1} = S_n + \frac{(-1)^{n+1}}{4(n+1)+2}$$

$$\Rightarrow S_{n+1} = \frac{\pi}{8} + (-1)^n I_{n+1} + \frac{(-1)^{n+1}}{4(n+1)+2}$$

$$= \frac{\pi}{8} + (-1)^{n+1} \left[\frac{1}{4(n+1)+2} - I_{n+1} \right]$$

$$\text{Or } I_{n+2} + I_{n+1} = \frac{1}{4(n+1)+2}$$

$$\Rightarrow S_{n+1} = \frac{\pi}{8} + (-1)^{n+1} I_{n+2}$$

$$\text{donc } \forall n \in \mathbb{N}, S_n = \frac{\pi}{8} + (-1)^n I_{n+1}$$

$$b) \text{ on a } -1 \leq (-1)^n \leq 1$$

$$I_{n+1} \geq 0 \Rightarrow -I_{n+1} \leq (-1)^n I_{n+1} \leq I_{n+1}$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{8} - I_{n+1} \leq \frac{\pi}{8} + (-1)^n I_{n+1} \leq \frac{\pi}{8} + I_{n+1}$$

$$\text{soit } \frac{\pi}{8} - I_{n+1} \leq S_n \leq \frac{\pi}{8} + I_{n+1}$$

$$\text{Or } \lim_{n \rightarrow \infty} I_{n+1} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{\pi}{8}$$

Exercice N° 29 : $n \in \mathbb{N}^*$

$$f_n(x) = \frac{\sqrt{\ln x}}{x^n} \quad \text{Defn} = [1, +\infty[$$

$$1) a) \text{ dérivabilité de } f_n \text{ en } 1: f_n(1) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f_n(x) - f_n(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{\ln x}}{(x-1)x^n} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{\ln x}{x}}{x-1} = \frac{\sqrt{1}}{0^+} = +\infty \Rightarrow f_n \text{ n'est pas dérivable en } 1$$

et f_n admet en $(1,0)$ une demi-tangente verticale dirigée vers le haut

$$b) f_n \in \mathcal{C}^1 \text{ sur }]1, +\infty[\text{ car } \ln x > 0.$$


$$f_n'(x) = \frac{\left(\frac{1}{2}\right) x^{-n} - n x^{n-1} \sqrt{\ln x}}{x^{2n}} = \frac{x^{-n-1} - 2n x^{n-1} \sqrt{\ln x}}{x^{2n}}$$

$$= \frac{x^{-n-1} - 2n x^{n-1} \sqrt{\ln x}}{x^{2n}} = \frac{x^{-n-1}(1 - 2n \sqrt{\ln x})}{x^{2n}}$$

$$\Rightarrow f_n'(x) = \frac{1 - 2n \sqrt{\ln x}}{2x^{n+1} \sqrt{\ln x}}$$

$$\text{on résout } f_n'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - 2n \sqrt{\ln x} = 0$$

$$\Rightarrow \ln x = \frac{1}{2n} \Leftrightarrow x = e^{\frac{1}{2n}}$$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{\ln x}}{x^{n+1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{\ln x}{x^{2n+2}}} = 0$$

$$f_n(e^{1/(2n)}) = \frac{\sqrt{\frac{1}{2n}}}{e^{1/2}} = \frac{1}{\sqrt{2n}}$$

c) Positions de E_{n+1} et E_n

$$f_{n+1}(x) - f_n(x) = \frac{\sqrt{\ln x}}{x^{n+2}} - \frac{\sqrt{\ln x}}{x^{n+1}} = \frac{\sqrt{\ln x}}{x^{n+2}} (1 - x) = f_{n+1}(x) (1 - x)$$

or $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $f_n(x) \geq 0$


$$\Rightarrow \text{le signe } [f_{n+1} - f_n] = \text{signe } [1 - x] \leq 0$$

$\Rightarrow E_{n+1}$ est toujours située au-dessous de E_n .

d) on a $\varphi = 0$: Asymptote horizontale E_n

$S_1(e^{1/2}, \frac{1}{\sqrt{2}})$: extrême de E_1

$S_2(e^{1/4}, \frac{1}{2\sqrt{e}})$: extrême de E_2



$$\begin{aligned} 2) A(1) &= \int_1^1 f_1(x) dx = \int_1^1 \frac{1}{x} dx = 0 \\ &= \int_1^1 \frac{1}{x} (\ln x)^{\frac{1}{2}} dx = \left[\frac{2}{3} (\ln x)^{\frac{3}{2}} \right]_1^1 \\ &= \left[\frac{2}{3} \ln x \sqrt{\ln x} \right]_1^1 = \frac{2}{3} \ln 1 \sqrt{\ln 1} = 0 \end{aligned}$$

$$3) S_n = \sum_{k=0}^n \frac{\sqrt{\ln(1 + \frac{k}{2n})}}{1 + \frac{k}{2n}}$$

$$a) 0 \leq k \leq n-1 \Rightarrow 1 \leq 1 + \frac{k}{2n} \leq 1 + \frac{n-1}{2n}$$

$$\Rightarrow 1 \leq 1 + \frac{k}{2n} \leq \frac{3}{2} - \frac{1}{2n} \leq \sqrt{e} \quad (1)$$

$$1 \leq k+1 \leq n \Rightarrow \frac{1}{2n} \leq 1 + \frac{k}{2n} \leq \frac{3}{2} - \frac{1}{2n} \quad (2)$$

$$D) d(2) \Rightarrow \left[1 + \frac{k}{2n}, 1 + \frac{k+1}{2n} \right] \subset [1, \sqrt{e}]$$

$$E_n \nearrow \text{ sur } [1, \sqrt{e}] \text{ d'où } 1 + \frac{k}{2n} \leq x \leq 1 + \frac{k+1}{2n}$$

$$\Rightarrow f_1\left(1 + \frac{k}{2n}\right) \leq f_1(x) \leq f_1\left(1 + \frac{k+1}{2n}\right)$$

$$\text{d'où } \int_{1 + \frac{k}{2n}}^{1 + \frac{k+1}{2n}} f_1(x) dx \leq \int_{1 + \frac{k}{2n}}^{1 + \frac{k+1}{2n}} f_1(x) dx \leq \int_{1 + \frac{k}{2n}}^{1 + \frac{k+1}{2n}} f_1\left(1 + \frac{k+1}{2n}\right) dx$$

$$\Rightarrow f_1\left(1 + \frac{k}{2n}\right) \left[x \right]_{1 + \frac{k}{2n}}^{1 + \frac{k+1}{2n}} \leq \int_{1 + \frac{k}{2n}}^{1 + \frac{k+1}{2n}} f_1(x) dx \leq f_1\left(1 + \frac{k+1}{2n}\right) \left[x \right]_{1 + \frac{k}{2n}}^{1 + \frac{k+1}{2n}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k}{2n}\right) \leq \int_{1 + \frac{k}{2n}}^{1 + \frac{k+1}{2n}} f_1(x) dx \leq \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k+1}{2n}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k}{2n}\right) \leq \int_{1 + \frac{k}{2n}}^{1 + \frac{k+1}{2n}} f_1(x) dx \leq \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k+1}{2n}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k}{2n}\right) \leq \int_{1 + \frac{k}{2n}}^{1 + \frac{k+1}{2n}} f_1(x) dx \leq \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k+1}{2n}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k}{2n}\right) \leq \int_{1 + \frac{k}{2n}}^{1 + \frac{k+1}{2n}} f_1(x) dx \leq \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k+1}{2n}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k}{2n}\right) \leq \int_{1 + \frac{k}{2n}}^{1 + \frac{k+1}{2n}} f_1(x) dx \leq \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k+1}{2n}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k}{2n}\right) \leq \int_{1 + \frac{k}{2n}}^{1 + \frac{k+1}{2n}} f_1(x) dx \leq \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k+1}{2n}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k}{2n}\right) \leq \int_{1 + \frac{k}{2n}}^{1 + \frac{k+1}{2n}} f_1(x) dx \leq \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k+1}{2n}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k}{2n}\right) \leq \int_{1 + \frac{k}{2n}}^{1 + \frac{k+1}{2n}} f_1(x) dx \leq \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k+1}{2n}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k}{2n}\right) \leq \int_{1 + \frac{k}{2n}}^{1 + \frac{k+1}{2n}} f_1(x) dx \leq \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k+1}{2n}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k}{2n}\right) \leq \int_{1 + \frac{k}{2n}}^{1 + \frac{k+1}{2n}} f_1(x) dx \leq \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k+1}{2n}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k}{2n}\right) \leq \int_{1 + \frac{k}{2n}}^{1 + \frac{k+1}{2n}} f_1(x) dx \leq \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k+1}{2n}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k}{2n}\right) \leq \int_{1 + \frac{k}{2n}}^{1 + \frac{k+1}{2n}} f_1(x) dx \leq \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k+1}{2n}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k}{2n}\right) \leq \int_{1 + \frac{k}{2n}}^{1 + \frac{k+1}{2n}} f_1(x) dx \leq \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k+1}{2n}\right)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k}{2n}\right) &= \frac{1}{2n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{2x \cdot \sqrt{\ln(1 + \frac{k}{2n})}}{2n + k} \\ &= S_n - \frac{\sqrt{\ln(\frac{3}{2})}}{2n} = S_n - \frac{1}{2n} \frac{\sqrt{\ln(\frac{3}{2})}}{\frac{3}{2}} \\ &= S_n - \frac{1}{2n} f_1\left(\frac{3}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k+1}{2n}\right) &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{2n} f_1\left(1 + \frac{k}{2n}\right) \\ &= \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{\ln(1 + \frac{k}{2n})}}{1 + \frac{k}{2n}} = \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{\ln(1 + \frac{k}{2n})}}{2n + k} \\ &= S_n - \frac{\sqrt{\ln 1}}{2n} = S_n \end{aligned}$$

$$\text{d) } \sum_{k=0}^{n-1} \int_{1 + \frac{k}{2n}}^{1 + \frac{k+1}{2n}} f_1(x) dx = \int_1^{\frac{3}{2}} f_1(x) dx = A\left(\frac{3}{2}\right)$$

alors en utilisant la sommation de l'inégalité de 3°) a) on obtient:

$$S_n - \frac{1}{2n} f_1\left(\frac{3}{2}\right) \leq A\left(\frac{3}{2}\right) \leq S_n$$

$$c) \text{ on a déjà } A\left(\frac{3}{2}\right) \leq S_n \quad (1)$$

$$\text{d) } S_n - \frac{1}{2n} f_1\left(\frac{3}{2}\right) \leq A\left(\frac{3}{2}\right) \quad (2)$$

$$\Rightarrow S_n \leq A\left(\frac{3}{2}\right) + \frac{1}{2n} f_1\left(\frac{3}{2}\right) \quad (2)$$

$$D) d(2) \Rightarrow A\left(\frac{3}{2}\right) \leq S_n \leq A\left(\frac{3}{2}\right) + \frac{1}{2n} f_1\left(\frac{3}{2}\right)$$

$$d) f_1\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\ln(\frac{3}{2})}}{\frac{3}{2}} : \text{ car } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2n} f_1\left(\frac{3}{2}\right) = 0$$


$$\Rightarrow \lim S_n = A\left(\frac{3}{2}\right)$$

ou d'après 2) $A\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{2}{3} \ln\left(\frac{3}{2}\right) \sqrt{\ln\left(\frac{3}{2}\right)}$


$$\Rightarrow \lim S_n = \frac{2}{3} \ln\left(\frac{3}{2}\right) \sqrt{\ln\left(\frac{3}{2}\right)}$$

معادلة الخوارزمي الرائعة

سئل الخوارزمي عالم الرياضيات عن الإنسان فأجاب :
إذا كان الإنسان ذا اخلاق فهو 1=
وإذا كان الإنسان ذا جمال فأضيف الى الواحد صفراً = 10
وإذا كان ذا مال ايضاً فأضيف صفراً آخر = 100
وإذا كان ذا حسب ونسب فأضيف صفراً آخر = 1000
فإذا ذهب العدد واحد وهو الاخلاق ذهبت قيمة الإنسان وبقيت
الأصفار




ANALYSE



Lecture Graphique

Exercice N° 30 :



1) a) $f(-\infty, 2] =]0, 1]$

b) $h = g \circ f$
 $\forall x \in [1, +\infty[, f(x) \in [-1, 0]$
 et g est définie sur $[-1, 0]$
 $\Rightarrow h$ est définie sur $[1, +\infty[$

2) $h(x) = 0 \Rightarrow g(f(x)) = 0$
 $\Rightarrow f(x) = -1 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow S_P = \{2\}$
 3) $h(1) = g(f(1)) = g(0) = \frac{1}{2}$
 $\bullet h'(2) = ?$
 or $h'(x) = (g \circ f)'(x) = f'(x) \cdot g'(f(x))$
 $\Rightarrow h'(2) = f'(2) \cdot g'(f(2))$
 $= 0 \cdot g'(-1) = 0$

$\bullet \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(f(x)) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(0) = \frac{1}{2}$

4) h existe car f existe et g existe
 $\bullet D_f = \mathbb{R}$ et $D_g =]-\infty, 0] \cup]1, +\infty[$
 $\Rightarrow$ il faut que $f(x) \in]-\infty, 0] \cup]1, +\infty[$
 $\Rightarrow x \in [1, +\infty[$
 $\bullet h'(x) = f'(x) \cdot g'(f(x))$
 on résoud sur $[1, +\infty[$ $h'(x) = 0$

$\Leftrightarrow f'(x) = 0$ ou $g'(f(x)) = 0$
 $\Leftrightarrow x = 2$ ou $f(x) = 0 \Rightarrow x = 1$
 si $x \in [1, +\infty[, f(x) \in [-1, 0]$
 g sur $[-1, 0] \Rightarrow g'(f(x)) \neq 0$
 $\Rightarrow \text{Sign}(h') = \text{Sign}(f')$

x	1	2	+
h'(x)	+	+	+
h(x)	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$

$h(1) = g(f(1)) = g(0) = \frac{1}{2}$ $h(2) = g(f(2)) = g(-1) = 0$

5) (E): $n \cdot h(x) = 1 \quad / \quad n \geq 3$

a) (E): $h(x) = \frac{1}{n} \in]0, \frac{1}{2}]$ car $n \geq 3$

• Si $x \in]1, 2[$, $h \in \text{strict } \downarrow$

et $\frac{1}{n} \in]0, \frac{1}{2}] \Rightarrow$ il existe un unique $a_n \in]1, 2[\mid h(a_n) = \frac{1}{n}$

• Si $x \in]2, +\infty[$, $h \in \text{strict } \uparrow$

et $\frac{1}{n} \in]0, \frac{1}{2}] \Rightarrow$ il existe un unique $b_n \in]2, +\infty[\mid h(b_n) = \frac{1}{n}$

concl: (E) admet exactement 2 solutions telles que $1 < a_n < 2 < b_n$

b) $h(a_{n+1}) = \frac{1}{n+1}$ et $h(a_n) = \frac{1}{n}$

or $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} \Rightarrow h(a_{n+1}) < h(a_n)$


or $h \in \text{strict } \downarrow$ sur $]1, 2[\Rightarrow a_{n+1} > a_n$ d'où $a_n \nearrow$

et $h \nearrow$ sur $]2, +\infty[\Rightarrow b_{n+1} < b_n$ d'où $b_n \searrow$


c) $a_n \nearrow$ majorée par 2 $\Rightarrow a_n$ convergente

• $b_n \searrow$ minorée par 2 $\Rightarrow b_n$ convergente

THÉORÈME DU SANDWICH



Exercice N° 31 :



1) Lorsque (Γ) coupe l'axe des abscisses

la courbe E admet un extréma

$\Rightarrow$ (Γ) est la courbe de f'

et E la courbe de f .

2) $f(0) = 1, f'(0) = 1$

$f(-1) = 0, f'(-1) = 0$

3) $A = \int_{-1}^0 f'(x) dx = [f(x)]_{-1}^0$

$= f(0) - f(-1) = 1 - 0 = 1$

II) $f(x) = (x+1)^2 \cdot e^x$

1) a) $I = \int_{-1}^0 f(x) dx = \int_{-1}^0 (x+1)^2 \cdot e^x dx$

on pose $u(x) = (x+1)^2 \Rightarrow u'(x) = 2(x+1)$

$v'(x) = e^x \Rightarrow v(x) = e^x$

$\Rightarrow I = \left[-(x+1)^2 e^x \right]_{-1}^0 + 2 \int_{-1}^0 (x+1) e^x dx$

on pose $u(x) = x+1 \Rightarrow u'(x) = 1$
 $v'(x) = e^x \Rightarrow v(x) = e^x$

$\Rightarrow J = \left[-(x+1)^2 e^x \right]_{-1}^0 + \int_{-1}^0 e^x dx$
 $= \left[-(x+1)^2 e^x - e^x \right]_{-1}^0$

d'où $I = \left[-(x+1)^2 e^x - 2(x+1) e^x - 2e^x \right]_{-1}^0$

$\Rightarrow I = \left[-(x^2 + 4x + 5) e^x \right]_{-1}^0$

$I = -5 + 2e$

b) $A' = \int_{-1}^0 [f'(x) - f(x)] dx$
 $= \int_{-1}^0 f'(x) dx - \int_{-1}^0 f(x) dx$
 $= 1 - (-5 + 2e) \Rightarrow A = 6 - 2e$

2) $g(x) = f(x)$ si $x \in [1, +\infty[$

a) $f \in \text{strict } \downarrow$ sur $[1, +\infty[$

g réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur

$f([1, +\infty[)$ ou $]0, 4e^{-1}] = g$

b) on pose $h(x) = g(x) - x$

$h'(x) = g'(x) - 1 < 0$ car $g \searrow$

$x \mid 1 \quad \alpha \quad +\infty \quad h(1) = g(1) - 1 =$

$4e^{-1} - 1$

$h' \mid 4e^{-1} - 1 \quad \ominus \quad \rightarrow \quad h \mid -\infty \quad +\infty \quad h(x) = -\infty$

$h \in \mathcal{C}^1:]-\infty, +\infty[\Rightarrow h$ réels
une biject. de $]1, +\infty[\rightarrow]-\infty, e^{-1}-1]$
 $\alpha \in]-\infty, e^{-1}-1] \Rightarrow$ il existe un
unique $x \in]1, +\infty[/ h(x) = \alpha$
 $\Rightarrow g(\alpha) - \alpha = 0 \Rightarrow g(\alpha) = \alpha$
 $\alpha h(1,41) = g(1,41) - 1,41 \approx \dots > 0$
 $h(1,42) = g(1,42) - 1,42 \approx \dots < 0$
 $\Rightarrow h(1,41) \cdot h(1,42) < 0 \Rightarrow$

$$1,41 < \alpha < 1,42$$

c) on a $g \stackrel{!}{=} \text{en } \alpha \in]1, +\infty[$
et $g'(\alpha) = 0 \Rightarrow g'$ n'est dérivable
en $g(\alpha) = \alpha$

$$(g^{-1})'(\alpha) = \frac{1}{g'(g^{-1}(\alpha))}$$

$$\alpha g(\alpha) = \alpha \Leftrightarrow g^{-1}(\alpha) = \alpha$$

$$\Rightarrow g'(g^{-1}(\alpha)) = g'(\alpha)$$

$$\alpha f'(x) = 2(x+1)e^{-x} - (x+1)^2 e^{-x}$$

$$\Rightarrow f'(x) = e^{-x}(-x^2 + 1)$$

$$\Rightarrow g'(\alpha) = f'(\alpha) = e^{-\alpha}(-\alpha^2 + 1)$$

$$\alpha g(\alpha) = \alpha \Leftrightarrow (\alpha+1)^2 e^{-\alpha} = \alpha$$

$$\Rightarrow e^{-\alpha} = \frac{\alpha}{(\alpha+1)^2}$$

$$\Rightarrow g'(\alpha) = \frac{\alpha(1-\alpha^2)}{(\alpha+1)^2}$$

$$\Rightarrow (g^{-1})'(\alpha) = \frac{1}{\frac{\alpha(1-\alpha^2)}{(\alpha+1)^2}} = \frac{(\alpha+1)^2}{\alpha(1-\alpha^2)}$$

$$\Rightarrow (g^{-1})'(\alpha) = \frac{(\alpha+1)^2}{\alpha(1-\alpha)(1+\alpha)}$$

$$\Rightarrow (g^{-1})'(\alpha) = \frac{\alpha+1}{\alpha(1-\alpha)}$$

Problèmes

Problème N° 1 :

$$(A) f(x) = \frac{1}{1-xe^{-x}} \quad I = \int_0^1 f(x) dx$$

$$1) \text{ on } \forall x \in \mathbb{R}, xe^{-x} \leq e^{-1}$$

$$\text{on pose } u(x) = xe^{-x} \quad D_u = \mathbb{R}$$

$$u'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = e^{-x}(1-x)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} u(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{-x} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$u'(x)$		+	-
$u(x)$		$\nearrow e^{-1}$	$\searrow 0$


$$e^{-1}: \text{maximum absolu} \Rightarrow \forall x \in \mathbb{R}, u(x) \leq e^{-1}$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, xe^{-x} \leq e^{-1}$$

$\bullet$ f existe car $1 - u(x) \neq 0$
 $\Rightarrow u(x) \neq 1$ toujours vrai car $u(x) \leq e^{-1}$
 $\Rightarrow D_f = \mathbb{R}$

$$2) \forall x \in \mathbb{R} \quad f'(x) = \frac{u'(x)}{(1-u(x))^2} = \frac{(1-x)e^{-x}}{(1-xe^{-x})^2}$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$		$\nearrow \frac{1}{1-e^{-1}}$	$\searrow \frac{1}{1-e^{-1}}$



$$3) \text{ d'après le TV on a } \forall x \geq 0, 1 \leq f(x) \leq \frac{1}{1-e^{-1}}$$

$$\Rightarrow 1 \leq f(x) \leq \frac{e}{e-1}$$

$$\Rightarrow \int_0^1 1 dx \leq \int_0^1 f(x) dx \leq \int_0^1 \frac{e}{e-1} dx$$

$$\Rightarrow [x]_0^1 \leq I \leq \frac{e}{e-1} [x]_0^1 \Rightarrow 1 \leq I \leq \frac{e}{e-1}$$

$$(B) J_n = \int_0^1 x^n e^{-nx} dx \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$$1) a) J_1 = \int_0^1 x e^{-x} dx$$

$$\text{on pose } \begin{cases} u(x) = x & \rightarrow u'(x) = 1 \\ v'(x) = e^{-x} & \rightarrow v(x) = -e^{-x} \end{cases}$$

$$\Rightarrow J_1 = [-xe^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = [-xe^{-x} - e^{-x}]_0^1$$

$$\Rightarrow J_1 = [-e^{-x}]_0^1 \Rightarrow J_1 = 0 - (-1) \Rightarrow J_1 = 1$$

$$b) H(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-2x} \text{ sur } \mathbb{R}$$

$$H'(x) = (2ax + b)e^{-2x} - 2(ax^2 + bx + c)e^{-2x}$$

$$= (2ax^2 + (2a - 2b)x + (b - 2c))e^{-2x}$$

$$H'(x) = h(x) = x^2 e^{-2x} \text{ par identifi}$$

$$\begin{cases} -2a = 1 \\ 2a - 2b = 0 \\ b - 2c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = a = -\frac{1}{2} \\ c = \frac{1}{4} \end{cases}$$

$$\Rightarrow H(x) = (-\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{4})e^{-2x} \text{ primitive de } h(x)$$

$$J_2 = \int_0^1 x^2 e^{-2x} dx = \int_0^1 h(x) dx = [H(x)]_0^1 = H(1) - H(0)$$

$$\Rightarrow J_2 = (-\frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4})e^{-2} - (0 + 0 - \frac{1}{4})$$

$$\Rightarrow J_2 = \frac{1}{4} - \frac{5}{4}e^{-2} \Rightarrow J_2 = \frac{1}{4}(1 - \frac{5}{e^2})$$

$$2) \forall n \in \mathbb{N}^*, U_n = 1 + J_1 + J_2 + \dots + J_n$$

$$a) 1 + xe^{-x} + x^2 e^{-2x} + \dots + x^n e^{-nx} = \sum_{k=0}^n (xe^{-x})^k$$

$$= \frac{1 - (xe^{-x})^{n+1}}{1 - xe^{-x}} = \frac{1 - x^{n+1} e^{-(n+1)x}}{1 - xe^{-x}}$$

$$\Rightarrow 1 + xe^{-x} + x^2 e^{-2x} + \dots + x^n e^{-nx} = \frac{1}{1 - xe^{-x}} - \frac{x^{n+1} e^{-(n+1)x}}{1 - xe^{-x}}$$

$$\Rightarrow 1 + xe^{-x} + x^2 e^{-2x} + \dots + x^n e^{-nx} = f(x) - x^{n+1} e^{-(n+1)x} f(x)$$

$$\Rightarrow \int_0^1 dx + \int_0^1 xe^{-x} dx + \int_0^1 x^2 e^{-2x} dx + \dots + \int_0^1 x^n e^{-nx} dx =$$

$$\int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 x^{n+1} e^{-(n+1)x} f(x) dx$$

$$\Rightarrow 1 + J_1 + J_2 + \dots + J_n = I - \int_0^1 x^{n+1} e^{-(n+1)x} f(x) dx$$

$$\Rightarrow U_n = I - \int_0^1 x^{n+1} e^{-(n+1)x} f(x) dx$$

$$\Rightarrow I - U_n = \int_0^1 x^{n+1} e^{-(n+1)x} f(x) dx$$

$$c) \text{ Rq } 0 \leq \frac{x^{n+1} e^{-(n+1)x}}{1 - xe^{-x}} \leq \frac{1}{e^n(e-1)}$$

$$\text{car } 0 \leq xe^{-x} \leq e^{-1} \Rightarrow 0 \leq x^{n+1} e^{-(n+1)x} \leq e^{-(n+1)}$$

$$\Rightarrow 0 \leq x^{n+1} e^{-(n+1)x} \leq \frac{1}{e^{n+1}} \Rightarrow 0 \leq x^{n+1} e^{-(n+1)x} \leq \frac{1}{e^n(e-1)}$$

$$\text{Produit: } 0 \leq \frac{x^{n+1} e^{-(n+1)x}}{1 - xe^{-x}} \leq \frac{1}{e^n(e-1)}$$

$$\Rightarrow 0 \leq \int_0^1 \frac{x^{n+1} e^{-(n+1)x}}{1 - xe^{-x}} dx \leq \frac{1}{e^n(e-1)} \int_0^1 dx$$

$$\Rightarrow 0 \leq I - U_n \leq \frac{1}{e^n(e-1)}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^n(e-1)} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (I - U_n) = 0$$

$$\text{or } I : \text{ constante} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = I$$

$$\text{Concl: } U_n \text{ converge vers } I$$

$$3) \text{ car } 0 \leq I - U_n \leq \frac{1}{e^n(e-1)}$$

$$\text{pu } n=2 \Rightarrow 0 \leq I - U_2 \leq \frac{1}{e^2(e-1)}$$

$$\Rightarrow U_2 \leq I \leq U_2 + \frac{1}{e^2(e-1)}$$

$$\text{car } \frac{1}{e^2(e-1)} \approx 5 \cdot 10^{-2}$$

$$\Rightarrow I \approx U_2 \pm 5 \cdot 10^{-2} \text{ pres}$$

$$\text{or } U_2 \approx 1 + J_1 + J_2 = 1 + 1 + \frac{1}{4}(1 - \frac{5}{e^2})$$

$$\Rightarrow U_2 \approx \frac{9}{4} - \frac{5}{4e^2} \approx 5 \cdot 10^{-2} \text{ pres}$$

Problème N° 2 :

$$f(t) = \frac{t-1}{\ln t} \text{ sur }]0,1[$$

$$f(0) = 0 \text{ et } f(1) = 1$$


$$\textcircled{A} 1) \text{ car } \forall t \in]0,1[, \ln t \neq 0$$

$$\Rightarrow f(t) \leq 0 \text{ sur }]0,1[$$

$$f'(t) = \frac{\ln t - \frac{1}{t}(t-1)}{(\ln t)^2} = \frac{\ln t - 1 + \frac{1}{t}}{(\ln t)^2}$$

$$\text{on pose } A(t) = \ln t - 1 + \frac{1}{t} \text{ sur }]0,1[$$

$$A'(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{t^2} = \frac{t-1}{t^2} < 0 \text{ } \forall t \in]0,1[$$




$$\lim_{t \rightarrow 0^+} A(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\ln t - 1 + \frac{1}{t} \right) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{t \ln t - t + 1}{t} \right)$$

$$= \frac{1}{0^+} = +\infty$$

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} A(t) = \lim_{t \rightarrow 1^-} \left(\ln t - 1 + \frac{1}{t} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \forall t \in]0,1[\quad A(t) > 0 \Rightarrow f'(t) > 0$$



$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t-1}{\ln t} = \frac{-1}{-\infty} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} f(t) = \lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{t-1}{\ln t} = \lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{1}{\frac{\ln t}{t-1}} = \frac{1}{1} = 1$$

2) $\frac{1}{2}$ de f en 0^+ .

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x-1}{\ln x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x-1}{x \ln x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x-1}{x \ln x}$$

= $\frac{-1}{0^-} = +\infty \Rightarrow f$ n'est pas $\frac{1}{2}$ en 0^+ et f admet en $\mathcal{D}(0,0)$ une demi-tangente verticale dirigée vers le haut.

3) a) $\forall u \in [0, \frac{1}{2}]$, $0 \leq \frac{1}{1-u} - (1+u) \leq 2u^2$
 oua $\frac{1}{1-u} - (1+u) = \frac{1 - (1+u)(1-u)}{1-u} = \frac{u^2}{1-u}$

$$\text{car } 0 \leq u \leq \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} \leq 1-u \leq 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \leq 1-u \leq 1 \Rightarrow 0 \leq \frac{1}{1-u} \leq 2$$

$$\text{donc } 0 \leq \frac{u^2}{1-u} \leq 2u^2$$

$$\text{donc } \forall u \in [0, \frac{1}{2}]; \quad 0 \leq \frac{1}{1-u} - (1+u) \leq 2u^2$$

b) oua $\forall t \in [0, 1]$; $0 \leq \frac{1}{1-t} - (1+t) \leq 2t^2$
 pour $0 \leq u \Rightarrow 0 \leq \int_0^u \left[\frac{1}{1-t} - (1+t) \right] dt \leq \int_0^u 2t^2 dt$

$$\Rightarrow 0 \leq \left[-\ln(1-t) - \left(t + \frac{1}{2}t^2\right) \right]_0^u \leq \left[\frac{2}{3}t^3 \right]_0^u$$

$$\Rightarrow 0 \leq -\ln(1-u) - \left(u + \frac{u^2}{2}\right) \leq \frac{2}{3}u^3$$

c) $g(x) = \frac{1}{f(x)} / x \in]0, 1]$

$$\Rightarrow g(x) = \frac{\ln x}{x-1}; \quad g(1) = \frac{1}{f(1)} = 1$$

$$\text{or } 0 \leq -\ln(1-u) - \left(u + \frac{u^2}{2}\right) \leq \frac{2}{3}u^3$$

$$\Rightarrow u + \frac{u^2}{2} \leq -\ln(1-u) \leq \frac{2}{3}u^3 + u + \frac{u^2}{2}$$

$$\Rightarrow -\frac{2}{3}u^3 - u - \frac{u^2}{2} \leq \ln(1-u) \leq -u - \frac{u^2}{2}$$

$$\text{donc } -u \left[1 + \frac{2}{3}u^2 + 1 + \frac{1}{2}u \right] \leq \ln(1-u) \leq -u \left(1 + \frac{1}{2}u \right)$$

$$\text{en pos } x = 1-u \Leftrightarrow u = 1-x$$

$$\text{si } u \in [0, \frac{1}{2}] \Rightarrow x \in [\frac{1}{2}, 1]$$

$$\Rightarrow (x-1) \left[\frac{2}{3}(1-x)^2 + 1 + \frac{1}{2}(1-x) \right] \leq \ln x \leq (x-1) \left[1 + \frac{1}{2}(1-x) \right]$$

$$x-1 < 0 \Rightarrow 1 - \frac{1}{2}(1-x) \leq \frac{\ln x}{x-1} \leq \frac{2}{3}(1-x)^2 + 1 + \frac{1}{2}(1-x)$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2}(1-x) \leq \frac{\ln x}{x-1} - 1 \leq \frac{2}{3}(1-x)^2 - \frac{1}{2}(1-x)$$

$$\text{donc } -\frac{1}{2}(1-x) \leq g(x) - 1 \leq \frac{2}{3}(1-x)^2 - \frac{1}{2}(1-x)$$

$\frac{1}{2}$ de g en 1^- .

$$\text{pm } x \in]\frac{1}{2}, 1[\Rightarrow x-1 < 0$$

$$\Rightarrow \frac{2}{3}(1-x) + \frac{1}{2} \leq \frac{g(x) - g(1)}{x-1} \leq -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2}{3}(1-x) + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{g(x) - g(1)}{x-1} = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow g \text{ n'est pas } \frac{1}{2} \text{ en } 1^- \text{ et } g'(1) = -\frac{1}{2}$$

d) oua $g(x) = \frac{1}{f(x)} \Leftrightarrow f(x) = \frac{1}{g(x)}$

$$\text{Comme } g \text{ est en } 1 \text{ et } g'(1) \neq 0$$


$$\Rightarrow f \text{ n'est pas } \frac{1}{2} \text{ en } 1$$

$$f'(x) = \frac{-g'(x)}{[g(x)]^2} \Rightarrow f'(1) = \frac{-g'(1)}{[g(1)]^2}$$

$$\Leftrightarrow f'(1) = \frac{-(-\frac{1}{2})}{1^2} \Rightarrow f'(1) = \frac{1}{2}$$

4) $T_1: y = f'(1)(x-1) + f(1)$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$



B) $\forall x \in]0, 1[; I(x) = \int_x^1 \frac{1}{t} dt$ $J(x) = \int_x^1 \frac{1}{t^2} dt$

1) $K(x) = J(x^2) - J(x) / x \in]0, 1[$

a) oua $t \mapsto \frac{1}{t} \in \mathcal{M}^+(]0, 1[) \Rightarrow J \in \mathcal{M}^+(]0, 1[)$

et $x \mapsto x^2 \in \mathcal{M}^+(]0, 1[)$ et $x^2 \in]0, 1[\Rightarrow J \in \mathcal{M}^+(]0, 1[)$

$\Rightarrow K \in \mathcal{M}^+(]0, 1[)$ et $J'(x) = -\frac{1}{x^2}$

$$K'(x) = [J(x^2)]' - [J(x)]' = 2x \cdot J'(x^2) + J'(x)$$

$$= 2x \cdot \frac{1}{x^4} + \frac{1}{x^2}$$

$$\Rightarrow K'(x) = \frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^2} [2x + 1]$$

b) $f(x) - 2f(x^2) = \frac{x-1}{\ln x} - 2 \frac{x^2-1}{\ln x^2}$

$$= \frac{x-1}{\ln x} - \frac{2(x^2-1)}{2 \ln x} = \frac{x-1}{\ln x} - \frac{x^2-1}{\ln x}$$

$$\Rightarrow f(x) - 2f(x^2) = -x \frac{x-1}{\ln x} = -x f(x)$$

c) $f(t) - 2f(t^2) = -t f(t)$

$$\Rightarrow -\frac{1}{t} [f(t) - 2f(t^2)] = f(t) = K'(t)$$

$$\Rightarrow \int_x^1 f(t) dt = \int_x^1 k'(t) dt = [k(t)]_x^1$$

$$\Rightarrow I(x) = [k(x) - k(1)] = j(x^2) - j(x)$$

$$\Rightarrow I(x) = \int_{x^2}^1 \frac{1}{t} dt - \int_x^1 \frac{1}{t} dt$$

$$\Rightarrow I(x) = \int_{x^2}^x \frac{1}{t} dt = \int_{x^2}^x \frac{1}{t} dt$$

$$2) \varphi(t) = \ln(-\ln t) \quad / t \in]0, 1[$$

$$a) \forall t \in]0, 1[\Rightarrow t > 0 \text{ et } -\ln t > 0$$

$$\Rightarrow \varphi(t) \text{ est } \in]-\infty, 0[$$

$$\varphi'(t) = \frac{-\frac{1}{t}}{-\ln t} = \frac{1}{t \ln t}$$

$$b) \int_{x^2}^x \frac{1}{t \ln t} dt = \int_{x^2}^x -\varphi'(t) dt = [-\varphi(t)]_{x^2}^x$$

$$= -\varphi(x^2) - \varphi(x) = \ln(-\ln x^2) - \ln(-\ln x)$$

$$= \ln\left[\frac{-2\ln x}{-\ln x}\right] = \ln 2 \Rightarrow \int_{x^2}^x \frac{1}{t \ln t} dt = \ln 2$$

$$3) 0 < t \leq x \leq 1 \Rightarrow \ln t \leq \ln x < 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\ln x} \leq \frac{1}{\ln t} \leq 0 \Rightarrow 0 \leq \frac{1}{\ln t} \leq \frac{1}{\ln x}$$

$$\text{Comme } x^2 < x \Rightarrow 0 \leq \int_{x^2}^x \frac{1}{t \ln t} dt \leq \int_{x^2}^x \frac{1}{x \ln x} dt$$

$$\Rightarrow 0 \leq \int_{x^2}^x \frac{1}{t \ln t} dt \leq \frac{1}{\ln x} (t)_{x^2}^x$$

$$\Rightarrow 0 \leq \left| \int_{x^2}^x \frac{1}{t \ln t} dt \right| \leq \frac{x - x^2}{\ln x} \leq \frac{x}{\ln x}$$

$$\Rightarrow 0 \leq \left| \int_{x^2}^x \frac{1}{t \ln t} dt \right| \leq \frac{-x}{\ln x} \quad \text{car } \ln x < 0$$

$$4) I(x) = \int_{x^2}^x \frac{1}{t \ln t} dt = \int_{x^2}^x \frac{1}{t \ln t} dt + \int_{x^2}^x \frac{1}{t \ln t} dt$$

$$\text{on } \frac{x}{\ln x} \leq \int_{x^2}^x \frac{1}{t \ln t} dt \leq \frac{-x}{\ln x}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{\ln x} + \ln 2 \leq I(x) \leq -\frac{x}{\ln x} + \ln 2$$

$$\text{Comme } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\ln x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} I(x) = \ln 2$$

$$5) a) I - I(x) = \int_0^1 f(t) dt - \int_x^1 f(t) dt = \int_0^x f(t) dt$$

$$b) \text{ on a d'après A) } 0 \leq f(t) \leq 1$$

$$\Rightarrow 0 \leq \int_0^x f(t) dt \leq \int_0^x 1 dt$$

$$\Rightarrow 0 \leq I - I(x) \leq x$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} x = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (I - I(x)) = 0$$

$$\Rightarrow I = \lim_{x \rightarrow 0} I(x) \Rightarrow I = \ln 2$$

Problème N° 3 :

$$f(x) = \frac{1}{n!} \cdot \frac{(\ln x)^n}{x^2} \quad \text{Def} =]1, +\infty[$$

$$1) a) f_1(x) = \frac{\ln x}{x^2} \quad \text{Def} =]1, +\infty[$$

$$f_1'(x) = \frac{(\frac{1}{x})x^2 - 2x \ln x}{x^4} = \frac{x(1 - 2\ln x)}{x^4}$$


$$\Rightarrow f_1'(x) = \frac{1 - 2\ln x}{x^3}$$

$$\text{on résoud } f_1'(x) = 0 \Rightarrow \ln x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \sqrt{e}$$

x	1	$\sqrt{e}$	$+\infty$
f_1	+	0	-
f_1	0	$\frac{1}{2e}$	0

$f_1(1) = 0$
 $f_1(\sqrt{e}) = \frac{1}{2e}$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0$
 $\Rightarrow D: y=0$ Asymptote Horizontale en $+\infty$

$$T_n: y = f_1'(1)(x-1) + f_1(1) \Rightarrow y = x-1$$



2) Position de E_{n+1} et E_n

$$\text{et } \varphi(x) = f_{n+1}(x) - f_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} \frac{(\ln x)^{n+1}}{x^2} - \frac{1}{n!} \frac{(\ln x)^n}{x^2}$$

$$\Rightarrow \varphi(x) = \frac{(\ln x)^{n+1}}{(n+1)! x^2} - \frac{(\ln x)^n}{n! x^2}$$

$$\Rightarrow \varphi(x) = \frac{(\ln x)^n}{(n+1)! x^2} [\ln x - (n+1)]$$

$$\varphi(x) = 0 \Rightarrow \ln x = n+1 \Rightarrow x = e^{n+1}$$

x	1	e^{n+1}	$+\infty$
$\varphi(x)$	0	-	+
Position de E_{n+1} et E_n		$\frac{E_n}{E_{n+1}} = \frac{1}{n+1}$	$\frac{E_{n+1}}{E_n} = n+1$

3) Variation de f_n : $f_n \leq f_{n+1}$

$$f_n(x) = \frac{1}{n!} \frac{(\ln x)^n}{x^2} \quad \text{Def} =]1, +\infty[$$

$$f_n'(x) = \frac{(\ln x)^{n-1}}{n! x^{2n-1}} (n - 2\ln x)$$

$f'_n(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1$
 $n - 2 \ln x = 0 \Leftrightarrow x = e^{\frac{n}{2}}$

x	1	$e^{\frac{n}{2}}$	$+\infty$
f'_n	0	+	-
f_n			$\rightarrow f_n(e^{\frac{n}{2}}) \rightarrow 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{n!} \frac{(\ln x)^n}{x^2} = 0$$

$$f_n(e^{\frac{n}{2}}) = \frac{1}{n!} \frac{(\ln(e^{\frac{n}{2}}))^n}{(e^{\frac{n}{2}})^2} = \frac{1}{n!} \left(\frac{n}{2}\right)^n e^{-\frac{n}{2}}$$

$$\Leftrightarrow f_n(e^{\frac{n}{2}}) = \frac{1}{n!} \left(\frac{n}{2e}\right)^n$$

1) On est sûr, f'_n s'annule en $(e^{\frac{n}{2}})$ et change de signe de $\oplus \rightarrow \ominus \Rightarrow f_n$ admet un maximum en $e^{\frac{n}{2}}$ égal à $f_n(e^{\frac{n}{2}}) = \frac{1}{n!} \left(\frac{n}{2e}\right)^n = \gamma_n$

$$2) \frac{f_{n+1}(x)}{f_n(x)} = \frac{\frac{1}{(n+1)!} \frac{(\ln x)^{n+1}}{x^2}}{\frac{1}{n!} \frac{(\ln x)^n}{x^2}} = \frac{n!}{(n+1)!} \frac{(\ln x)^{n+1}}{(\ln x)^n} = \frac{\ln x}{n+1}$$

$$\Rightarrow \gamma_{n+1} = \frac{1}{(n+1)!} \left(\frac{n+1}{2e}\right)^{n+1}$$

$$\text{or } \frac{1}{2} f_n(e^{\frac{n+1}{2}}) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{n!} \cdot \frac{(\ln(e^{\frac{n+1}{2}}))^{n+1}}{e^{\frac{n+1}{2}}} \right] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n!} \left(\frac{n+1}{2e}\right)^{n+1} \cdot \frac{1}{e} = \frac{1}{(n+1)!} \left(\frac{n+1}{2e}\right)^{n+1}$$

$$\text{car } \gamma_{n+1} = \frac{1}{2} f_n(e^{\frac{n+1}{2}})$$

$\bullet f_n \forall n \in [e^{\frac{n}{2}}, e^{\frac{n+1}{2}}] \subset [e^{\frac{n}{2}}, +\infty[$
 $\Rightarrow f_n(e^{\frac{n+1}{2}}) \leq f_n(e^{\frac{n}{2}}) = \gamma_n$

$$\text{or } \gamma_{n+1} = \frac{1}{2} f_n(e^{\frac{n+1}{2}}) \leq \frac{1}{2} \gamma_n$$

$$4) \text{ Or } \forall n \geq 1, \gamma_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \gamma_1$$

$$\text{pu } n=1, \gamma_1 \leq \gamma_1 \text{ vrai}$$

$$\text{suppose } \gamma_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \gamma_1 \text{ vrai}$$

$$\text{Donc } \gamma_{n+1} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n \gamma_1$$

$$\text{en fait } \gamma_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \gamma_1$$

$$\text{donc } \frac{1}{2} \gamma_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n \gamma_1$$

$$\text{or } \gamma_{n+1} \leq \frac{1}{2} \gamma_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n \gamma_1$$

$$\text{car } \forall n \geq 1, \gamma_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \gamma_1$$

$$\text{or } \gamma_1 = \frac{1}{2e} \Rightarrow 0 \leq \gamma_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{2e}$$

$$\frac{1}{2} e^{-1} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \gamma_n = 0$$

$$C) I_n(x) = \int_1^x f_n(t) dt$$

$$1) \text{ car } \forall x \geq 1, 0 \leq f_n(t) \leq \gamma_n : \text{ maximum}$$

$$\Rightarrow \int_1^x 0 \leq \int_1^x f_n(t) dt \leq \int_1^x \gamma_n dt$$

$$\Rightarrow 0 \leq I_n(x) \leq \gamma_n (x-1)$$

$$\text{car } 0 \leq I_n(x) \leq (x-1) \gamma_n$$

$$2) I_1(x) = \int_1^x f_1(t) dt = \int_1^x \frac{\ln t}{t^2} dt$$

on pose $u(t) = \ln t \rightarrow u'(t) = \frac{1}{t}$
 $v'(t) = \frac{1}{t^2} \rightarrow v(t) = -\frac{1}{t}$

$$\Rightarrow I_1(x) = \left[-\frac{\ln t}{t} \right]_1^x + \int_1^x \frac{1}{t^2} dt$$

$$\Leftrightarrow I_1(x) = \left[-\frac{\ln t}{t} - \frac{1}{t} \right]_1^x = \left[\frac{\ln x - 1}{x} + 1 \right]$$

$$\text{alors } I_1(x) = 1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x}$$

$$A = \int_1^e f_1(x) dx = I_1(e) = 1 - \frac{1}{e} - \frac{1}{e} = 1 - \frac{2}{e}$$

$$\Rightarrow A = \left(1 - \frac{2}{e}\right) \text{ ua}$$

$$\text{or } 1 \text{ ua} = \| \vec{u} \| \cdot \| \vec{v} \| \text{ cm}^2 = 10 \text{ cm}^2$$

$$\Rightarrow A = 10 - \frac{20}{e} \text{ cm}^2$$

$$\Rightarrow \text{Or } I_{n+1}(x) = I_n(x) - \frac{1}{(n+1)!} \frac{(\ln x)^{n+1}}{x}$$

$$\text{or } I_{n+1}(x) = \int_1^x \frac{1}{(n+1)!} \frac{(\ln t)^{n+1}}{t^2} dt$$

$$\text{on pose } u(t) = \frac{(\ln t)^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow u'(t) = \frac{1}{t} \frac{(\ln t)^n}{n!}$$

$$v'(t) = \frac{1}{t^2} \rightarrow v(t) = -\frac{1}{t}$$

$$\Rightarrow I_{n+1}(x) = \left[-\frac{1}{t} \frac{(\ln t)^{n+1}}{(n+1)!} \right]_1^x + \int_1^x \frac{1}{n!} \frac{(\ln t)^n}{t^2} dt$$

$$\Rightarrow I_{n+1}(x) = -\frac{1}{x} \frac{(\ln x)^{n+1}}{(n+1)!} + I_n(x)$$

BACHELIER
 en 2K21
 98%
 Veuillez patienter...

Problème N° 4 :

4) Ma $I_n(x) = 1 - \frac{1}{x} \left[1 + \frac{\ln x}{1!} + \dots + \frac{(\ln x)^n}{n!} \right]$

pour $n=1$: $I_1(x) = 1 - \frac{1}{x} \left[1 + \frac{\ln x}{1!} \right]$ vérifie

supposons $I_n(x) = 1 - \frac{1}{x} \left[1 + \frac{\ln x}{1!} + \dots + \frac{(\ln x)^n}{n!} \right]$

Déterminons $I_{n+1}(x) = 1 - \frac{1}{x} \left[1 + \frac{\ln x}{1!} + \dots + \frac{(\ln x)^{n+1}}{(n+1)!} \right]$

on a $I_{n+1}(x) = I_n(x) - \frac{1}{x} \frac{(\ln x)^{n+1}}{(n+1)!}$

$\Rightarrow I_{n+1}(x) = 1 - \frac{1}{x} \left[1 + \frac{\ln x}{1!} + \dots + \frac{(\ln x)^{n+1}}{(n+1)!} \right]$

$\Rightarrow I_{n+1}(x) = 1 - \frac{1}{x} \left[1 + \frac{\ln x}{1!} + \frac{(\ln x)^2}{2!} + \dots + \frac{(\ln x)^{n+1}}{(n+1)!} \right]$

On a : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $I_n(x) = 1 - \frac{1}{x} \left[1 + \frac{\ln x}{1!} + \dots + \frac{(\ln x)^n}{n!} \right]$

5) $U_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$

pour $x=e$ on a $I_n(e) = 1 - \frac{1}{e} \left[1 + \frac{1}{1!} + \dots + \frac{1}{n!} \right]$

$\Rightarrow I_n(e) = 1 - \frac{1}{e} U_n \Rightarrow e I_n(e) = e - U_n$

$\Rightarrow U_n = e - e I_n(e)$

on a $0 \leq I_n(x) \leq (e-1) y_n$

$\Rightarrow 0 \leq I_n(e) \leq (e-1) y_n$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} (e-1) y_n = 0$ car $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = 0$

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n(e) = 0$

d'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = e$

(A) $f(x) = \frac{1}{\sin x}$; $D_f =]0, \frac{\pi}{2}]$

1) on a $\forall x \in]0, \frac{\pi}{2}]$: $\sin x \neq 0$

$\Rightarrow f$ est dérivable sur $]0, \frac{\pi}{2}]$.

$f'(x) = -\frac{\cos x}{(\sin x)^2} \leq 0 \quad \forall x \in]0, \frac{\pi}{2}]$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$

$\Rightarrow x=0$: asymptote verticale

$f(\frac{\pi}{2}) = 1$

$f(x) = \frac{1}{\sin x}$

$f(x) = \frac{1}{\sin x}$

$f(x) = \frac{1}{\sin x}$

$f(x) = \frac{1}{\sin x}$

$f(x) = \frac{1}{\sin x}$

$f(x) = \frac{1}{\sin x}$

$f(x) = \frac{1}{\sin x}$

$f(x) = \frac{1}{\sin x}$

$f(x) = \frac{1}{\sin x}$

$f(x) = \frac{1}{\sin x}$

$f(x) = \frac{1}{\sin x}$

$f(x) = \frac{1}{\sin x}$

$f(x) = \frac{1}{\sin x}$

$f(x) = \frac{1}{\sin x}$

$f(x) = \frac{1}{\sin x}$

$\forall x \in]0, \frac{\pi}{2}] \Rightarrow (\frac{x}{e}) \in]0, \frac{\pi}{2}] \Rightarrow \ln(\frac{x}{e}) > 0$

$\Rightarrow F(x) = \ln(\ln(\frac{x}{e}))$ primitive de $\frac{1}{x \ln(\frac{x}{e})}$

b) $A = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = [F(x)]_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}$

$= F(\frac{\pi}{2}) - F(\frac{\pi}{3}) = \ln(\ln(\frac{\pi}{2})) - \ln(\ln(\frac{\pi}{3}))$

$\Rightarrow A = \ln(1) - \ln(\frac{\sqrt{3}}{2}) = \ln(\sqrt{3})$

alors $A = \frac{1}{2} \ln(3)$ (car)

3) a) f continue et strictement décroissante

sur $]0, \frac{\pi}{2}] \Rightarrow f$ réalise une bijection

de $]0, \frac{\pi}{2}]$ sur $[1, +\infty[$.

b) $g = f^{-1}$

on a $f(\frac{\pi}{2}) = 1 \Rightarrow g(1) = \frac{\pi}{2}$

$f(\frac{\pi}{4}) = \frac{1}{\sin(\frac{\pi}{4})} = \sqrt{2} \Rightarrow g(\sqrt{2}) = \frac{\pi}{4}$

$f(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{\sin(\frac{\pi}{6})} = 2 \Rightarrow g(2) = \frac{\pi}{6}$

c) on a $f \in C^1$ sur $]0, \frac{\pi}{2}]$ $\Rightarrow g$ est

dérivable sur $f([0, \frac{\pi}{2}]) \setminus \{f(\frac{\pi}{2})\} \Rightarrow$

g est dérivable sur $[1, +\infty[$ (15)

d'où g est dérivable sur $]1, +\infty[$.

$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} = \frac{1}{-\frac{\cos(g(x))}{\sin^2(g(x))}} = -\frac{\sin^2(g(x))}{\cos(g(x))}$

$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} = \frac{1}{-\frac{\cos(g(x))}{\sin^2(g(x))}} = -\frac{\sin^2(g(x))}{\cos(g(x))}$

$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} = \frac{1}{-\frac{\cos(g(x))}{\sin^2(g(x))}} = -\frac{\sin^2(g(x))}{\cos(g(x))}$

$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} = \frac{1}{-\frac{\cos(g(x))}{\sin^2(g(x))}} = -\frac{\sin^2(g(x))}{\cos(g(x))}$

$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} = \frac{1}{-\frac{\cos(g(x))}{\sin^2(g(x))}} = -\frac{\sin^2(g(x))}{\cos(g(x))}$

$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} = \frac{1}{-\frac{\cos(g(x))}{\sin^2(g(x))}} = -\frac{\sin^2(g(x))}{\cos(g(x))}$

on $f(g(x)) = x \Rightarrow \frac{1}{\sin(g(x))} = x$
 $\Rightarrow \sin(g(x)) = \frac{1}{x}$
 $\text{d'où } \cos(g(x)) = 1 - \sin^2(g(x)) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2-1}{x^2} > 0$
 $\Rightarrow |\cos(g(x))| = \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}$
 or $g(x) \in]0, \frac{\pi}{2}] \Rightarrow \cos(g(x)) \geq 0$
 d'où $|\cos(g(x))| = \cos(g(x)) = \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}$
 d'où $g'(x) = -\frac{\frac{1}{x^2}}{\frac{\sqrt{x^2-1}}{x}} = \frac{-1}{x \cdot \sqrt{x^2-1}}$
 and: $\forall x \in]1, +\infty[$, $g'(x) = \frac{-1}{x \cdot \sqrt{x^2-1}}$

(B) $H(x) = \int_{\ln 2}^x \frac{dt}{\sqrt{e^{2t}-1}}$
 $F(x) = H(\ln x) \quad / x \in]1, +\infty[$

1) a) on pose $h(t) = \frac{1}{\sqrt{e^{2t}-1}}$
 $h \in \text{car } e^{2t}-1 > 0 \Rightarrow e^{2t} > 1$
 $\Rightarrow t > 0 \Rightarrow h \in \text{car }]0, +\infty[$

d'où H est la primitive de $h(t)$ sur $]0, +\infty[$ qui s'annule en $\ln 2$

$\Rightarrow$ on a : $\begin{cases} 1) H \in \text{car }]0, +\infty[\\ 2) H'(x) = h(x) \\ 3) H(\ln 2) = 0 \end{cases}$

on $F(x) = H(\ln x)$

Comme $x \mapsto \ln x \in]0, +\infty[= D_h$
 et que $(\ln x) \in]0, +\infty[= D_h$
 $\Rightarrow F$ est dérivable sur $]1, +\infty[$
 $F'(x) = [H(\ln x)]' = \frac{1}{x} \cdot H'(\ln x)$
 $\Rightarrow F'(x) = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{e^{2\ln x}-1}} = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
 $\Rightarrow F'(x) = \frac{1}{x \cdot \sqrt{x^2-1}} \quad \forall x > 1$

d'où $F'(x) = -g'(x)$

b) $F(x) = -g(x) + k$
 or $F(\sqrt{2}) = 0$
 $\text{d'où } F(\sqrt{2}) = -g(\sqrt{2}) + k = -\frac{\pi}{4} + k \Rightarrow k = \frac{\pi}{4}$

and: $\forall x > 1$, $F(x) = \frac{\pi}{4} - g(x)$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{\pi}{4} - g(x) \right]$
 or $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$
 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \frac{\pi}{4}$

d) $\lim_{x \rightarrow 1^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left[\frac{\pi}{4} - g(x) \right]$
 or $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x) = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \frac{\pi}{4}$
 d'où $\lim_{x \rightarrow 1^+} F(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = 0$

2) $G(x) = F(x)$ si $x > 1$
 $G(1) = -\frac{\pi}{4}$

a) $\lim_{x \rightarrow 1^+} G(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} F(x) = -\frac{\pi}{4} = G(1)$

$\Rightarrow G$ prolonge F par continuité en 1^+

b) $T = \frac{G(x) - G(1)}{x - 1} = \frac{F(x) - (-\frac{\pi}{4})}{x - 1}$
 $= \frac{\frac{\pi}{4} - g(x) + \frac{\pi}{4}}{x - 1} = -\frac{f'(x) - \frac{\pi}{4}}{x - 1}$

on pose $x = f(t) \Rightarrow t = f^{-1}(x) = g(x)$


$\Rightarrow T = -\frac{t - \frac{\pi}{4}}{f(t) - 1} = \frac{-1}{\frac{f(t) - \frac{\pi}{4}}{t - \frac{\pi}{4}}}$

or $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{G(x) - G(1)}{x - 1} = \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-1}{\frac{f(t) - \frac{\pi}{4}}{t - \frac{\pi}{4}}} = \frac{-1}{0}$


$\Rightarrow G$ n'est pas dérivable en 1^+
 et (r) admet en $(1, -\frac{\pi}{4})$ une demi-tangente verticale dirigée vers le haut

c) $D_G = D_F \cup \{1\} =]1, +\infty[$

$G'(x) = F'(x) = \frac{1}{x \cdot \sqrt{x^2-1}} > 0$



$\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = \frac{\pi}{4} \Rightarrow y = \frac{\pi}{4}$: Asymptote en $(+\infty)$



3) Montrons que $(\Gamma) = \mathbb{R}(\mathbb{C}_f)$

on a Γ : courbe de G

$$\text{or } G(x) = F(x) = \frac{\pi}{4} - g(x) = \frac{\pi}{4} - f^{-1}(x)$$

$$\text{or } \mathbb{C}_f^{-1} = S_{\Delta}(\mathbb{C}_f) \quad (1) \quad \Delta: y=x$$

$$\text{on pose } \varphi(x) = -f^{-1}(x)$$

$$\Rightarrow \mathbb{C}_{\varphi} = S_{(\circ\pi)}(\mathbb{C}_f^{-1}) \quad (2)$$

$$\text{- d'ailleurs } G(x) = \frac{\pi}{4} - g(x) = \varphi(x) + \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow (\Gamma) = t_{\frac{\pi}{4}} \circ \mathbb{C}_{\varphi} \quad (3)$$


$$(1), (2) \text{ et } (3) \longrightarrow$$

$$(\Gamma) = t_{\frac{\pi}{4}} \circ S_{(\circ\pi)} \circ S_{\Delta}(\mathbb{C}_f)$$


$$\text{on pose } \Delta': y = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow t_{\frac{\pi}{4}} = S_{\Delta'} \circ S_{(\circ\pi)}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow t_{\frac{\pi}{4}} &= S_{\Delta'} \circ S_{(\circ\pi)} \\ \Rightarrow t_{\frac{\pi}{4}} \circ S_{(\circ\pi)} \circ S_{\Delta} &= S_{\Delta'} \circ S_{(\circ\pi)} \circ S_{(\circ\pi)} \circ S_{\Delta} \\ &\quad \text{Id } P \\ \Rightarrow t_{\frac{\pi}{4}} \circ S_{(\circ\pi)} \circ S_{\Delta} &= S_{\Delta'} \circ S_{\Delta} = R(\alpha, \alpha) \\ \text{avec } \Omega &= \Delta \cap \Delta' \Rightarrow \Omega\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \\ \text{et } \alpha &= 2(\Delta, \Delta') = 2\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\pi}{2} \\ \text{concl. : } \Gamma &= R\left(\alpha, \frac{\pi}{2}\right)(\mathbb{C}_f) / \Omega\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \end{aligned}$$



Mozart & Einstein
 QI > 160
 Et toi ?



Conseils Pratiques



I – Au début de l'épreuve :

- 1) Lire **lentement tout** le sujet et **souligner** dans chacun des exercices les données importantes
- 2) Faire l'exercice 1 sur une feuille à part, l'exercice 2 sur une autre feuille, etc...
- 3) Traiter immédiatement tout ce qui vous paraît "facile" en commençant par l'exercice qui comporte les questions les plus classiques.
- 4) Le temps de chaque exercice sera calculé en fonction du barème à raison de **12 mn** maximum **par point**

II – Pendant l'épreuve :

- 1) Certaines questions vous demanderont une recherche au brouillon, mais vous n'avez pas le temps de faire une rédaction détaillée au brouillon. Prenez au brouillon simplement des notes ou les dérivées non immédiates ou les encadrements non évidents etc...
- 2) Si vous ne savez pas traiter une question, **laissez un espace** et continuez tout en supposant que le résultat est acquis.
- 3) Sachez vous **arrêter** dès que les calculs deviennent trop importants. La réponse à une question ne dépasse pas une dizaine de lignes.
- 4) Les questions d'un même exercice ne sont pas indépendantes et surtout les parties d'une même question
- 5) La question qui commence par "En déduire ..." doit avoir pour solution une déduction de ce qui vient d'être traité.
- 6) Avant de passer à la question suivante, **relire** la question précédente et vérifier si vous avez répondu textuellement à ce qu'il demande.
- 7) Encadrer votre réponse en respectant les notations du texte.
- 8) **Espacer** suffisamment votre écriture afin de faciliter la tâche du correcteur
- 9) Rédiger correctement avec des explications appropriées, sans discours inutile, énoncer brièvement les théorèmes de cours que vous utilisez.
- 10) N'oubliez pas qu'une calculatrice aide à retrouver des limites, le calcul complexe ou même des intégrales etc ... mais elle ne remplace pas la justification

En fin,

Vérifier que vos résultats sont **logiques** : une probabilité est un réel $\in [0 ; 1]$; une aire est un réel positif, une fonction ne peut croître vers $-\infty$ ou décroître vers $+\infty$, le module d'un nombre complexe n'est pas négatif, un vecteur n'est jamais égal à son affixe ; etc...

Avec tous mes souhaits de réussite,

BONNE CHANCE